

线似前翅，端线，黑色；腹部浅黄灰色，布有黑褐细点。

分布 陕西、四川。

黄斑眉夜蛾 *Pangrapta flavomacula* Staudinger (图版 LXV-4)

Pangrapta flavomacula Staudinger, 1888, Stett. ent. Zeit. p. 279. (SE Siberia)

Pangrapta flavomacula: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 409. —Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 877. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 379.

Diapolia flavomacula: Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 172.

翅展 28 mm。头部与胸部灰褐色，足跗节外侧灰黑色，各节间有灰白斑；前翅淡紫灰色带黄色，密布暗褐色细点，前缘区色较白，基线黑色，自前缘脉至亚中褶，内线黑棕色，波浪形外弯，在中室处明显内凸，环纹黄色褐边，肾纹黄色黑边，中央有一黑色曲纹，中线黑褐色，自前缘脉外斜至中褶折角内斜，外线黑色，自前缘脉微曲外斜至 7 脉折角内斜，在 1—4 脉间稍内弯，中线与外线间大部金褐色并斜伸至近顶角处，亚端线褐色，波浪形，在 7 脉及 4 脉处外凸成齿，4 脉后内斜，线内侧在 7 脉前有一约呈三角形白斑，其外缘深棕色，近顶角另有一白色斜斑，端线黑色；后翅淡黄色，横脉纹黑色，内曲，外线黑色，弧形，亚端线双线黑色，锯齿形，全翅密布暗褐色细点，外线与亚端线之间最浓密，端线黑色；腹部灰色。

分布 黑龙江、江苏、福建、华东；日本，西伯利亚。

旗眉夜蛾 *Pangrapta mandarina* (Leech) (图版 LXV-5)

Zethes mandarina Leech, 1900, Trans. ent. Soc. Lond. p. 597. (湖北宜昌)

Pangrapta mandarina: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 406, pl. 74d. —Draudt, 1950, Mitt. Munch. ent. Ges. 40: 171.

翅展 40 mm。头部与胸部灰色杂有少许暗褐色，足跗节外侧黑灰色，各节间有白斑；前翅灰色微带紫褐色，基线只在中室前现一暗褐斜纹，内线黑褐色，粗而模糊，自前缘脉外斜至中室后缘折角内斜，环纹不显，肾纹浅灰色，中有一黑褐曲纹，外围模糊黑褐边，中线不清晰，黑褐色，与外线混合成一带状，外线黑褐色，自前缘脉直线外斜至中褶折角内斜并微呈波浪形，线外在 6 脉前有一半圆形大白斑，其中布有黑细点，斑的前缘黑褐色，有几个白点，亚端线隐约可见，暗褐色，波曲，顶角有一灰白色半圆形小斑，端线黑色；后翅色似前翅，亚端线内方的中室及 2 脉后带有黑褐色，中线与外线模糊，后者双线，亚端线仅在中褶后明显，间断为黑点列，内侧衬灰白色，端线黑色，缘毛浅红褐色；腹部灰色带紫褐色。

分布 陕西、湖北、湖南、海南。