

Pangrapta curtalis: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 408. ——Sugin, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 876.

翅展 30 mm。头部与胸部浅褐色，翅基片及后胸杂有暗褐色，足跗节外侧褐色，各节间有白斑；前翅浅褐色，布有暗褐细点，基线黑褐色，仅在前缘区现双斜纹，内线双线褐色，波浪形外弯，内一线弱，环纹斜圆形，褐边，中线褐色，自前缘脉外斜至中室下角折向内斜并呈波浪形，外线双线褐色，自前缘脉直线外斜至 6 脉折角微波浪形内斜，折角前两线粗，折角后外一线模糊，亚端线黑褐色，间断为锯齿形点列，自顶角微曲内斜，外线外方有一近半圆形大灰斑，其后端达 6 脉，其外缘有几个黑褐纹，其前缘有一列白点；后翅浅褐色，中线黑褐色，模糊，外线双线黑褐色，仅 6 脉后明显，在中褶至 2 脉间外弯，两线之间带有黑褐色，亚端线隐约可见，黑褐色，锯齿形，在 3 脉处齿尖近达翅外缘，中线至亚端线间布有黑褐细点，端线由一列新月形黑纹组成，缘毛褐色；腹部浅灰褐色，背面色暗并布有黑褐细点。

分布 江苏；朝鲜，日本。

暗影眉夜蛾 *Pangrapta disruptalis* (Walker) (图版 LXV - 9)

Saraca disruptalis Walker, [1866] 1865, List Spec. Ins. Colln Br. Mus. 34: 1190. (上海)

翅展 33 mm。头部与胸部暗褐色，足跗节有白斑；前翅暗褐色，基线黑色，仅在中室前可见，内线黑色，波曲外弯，不清晰，环纹隐约可见黑边，近圆形，肾纹为一模糊黑褐斑，中线与外线溶合成一黑褐带，外线黑色，直线外斜达中褶，折角微波曲内斜，外侧在 6 脉前有一灰白色近半圆形大斑，亚端线隐约可见，黑褐色，间断为点列，内侧衬褐白色，缘毛端部灰色；后翅暗褐色，中线粗，黑色，横脉纹窄，外线双线黑色，外斜至 3 脉折向内斜并波曲，亚端线黑色，间断为点列，内侧衬褐白色，缘毛端部灰色；腹部暗褐色。

分布 江苏。

饰眉夜蛾 *Pangrapta ornata* (Leech) (图版 LXV - 10)

Zethes ornata Leech, 1900, Trans. ent. Soc. p. 605. (湖北宜昌)

Diapolia ornata: Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 171.

Pangrapta ornata: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 408. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 378.

翅展 23mm。头部紫褐色，下唇须外侧暗灰色；胸部紫褐色；前翅紫红色，外半部带有金褐色，前缘黑色，外半部有几个白点，基线黑色杂白色，自前缘脉外弯至 1 脉，内线黑色杂白色，前后端内侧衬白色，中段间断，环纹只现一模糊的黑点，肾纹金褐色，内侧黑色，中线黑色，模糊，自前缘脉至中室外不清晰外斜，在 6 脉后内斜，外线

双线白色，线间黑色，6脉前微曲外斜，在6脉折角微曲内斜，亚端线黑色，微锯齿形，自顶角内弯，在4脉成一折角后内斜。在亚中褶成一内突角，外线与亚端线间在6脉前有一近三角形大白斑，微带褐色，其前缘有一列黑色纵纹，亚端线前端内侧一白斑，近翅外缘一黑线；后翅紫红色，中线黑色，外线双线白色，前半不显，内方的前缘区浅黄色，亚端线黑色锯齿形，近翅外缘一黑线；腹部红棕色。

分布 江苏、浙江、湖北、湖南。

缘斑眉夜蛾 *Pangrapta costinotata* (Butler) (图版 LXV - 11)

Saraca costinotata Butler, 1881, Trans. ent. Soc. Lond. p. 581. (日本)

Zethes costinotata: Leech, 1900, Trans. ent. Soc. p. 606.

Pangrapta costinotata: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 408. ——Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 878. ——Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 147.

翅展 25 mm 左右。头部与胸部紫灰棕色杂少许黑褐色，下唇须外侧大部黑褐色，足灰褐色；前翅紫棕色杂暗褐色，基线白色，自前缘脉至中室，内线白色，在中室前为一斜纹，在中室处内斜，其后波浪形，间断，环纹为一黑点，外线为一列白点，在4脉后内斜，至亚中褶，折向外弯，前端有一白色三角形斑，其前缘外半部有一黑点，亚端线黑褐色，不清晰，不整齐锯齿形，外线与亚端线间带有锈红色，亚端线前端内侧有一白点，近外缘有一列黑点，端线黑褐色，间断；后翅色似前翅，亚端区有一赭色宽带，近外缘有一列黑点，端线黑褐色，间断；腹部暗褐色。

分布 福建、广西；日本。

纱眉夜蛾 *Pangrapta textilis* (Leech) (图版 LXV - 12)

Saraca textilis Leech, 1889, Proc. zool. Soc. p. 567, pl. 52, fig. 12. (朝鲜；宁波, Foochau)

Zethes textilis: Leech, 1900, Trans. ent. Soc. p. 603.

Pangrapta textilis: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 409, pl. 71g. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 378.

翅展 26 mm。头部与胸部褐白色，密布深褐点，足跗节外侧褐黑色，各节间有白斑；前翅黄白色，布有黑褐细点，中脉及外线外方的各翅脉上黑褐点致密，基线黑褐色，仅前缘区可见，内线暗褐色，波曲外弯，环纹小，近圆形，有模糊黑褐边，肾纹窄曲，内缘黑褐色，中央有一黑曲纹，外线双线黑棕色，自前缘脉外斜至5脉折角内斜，在亚中褶处稍外弯，外线外方的前缘脉暗褐色，有一列黄白点，亚端线黄白色，内侧衬褐色，外侧衬黑褐色，在7脉处外凸，中段外弯，其后微波浪形，后端达臀角，4—5脉间有一黑褐纵纹窄越外线及亚端线达翅外缘，端线黑色，微波浪形，缘毛浅褐黄色带赭色，中有一波浪形黑线；后翅黄白色，有黑棕细点，中线与外线黑棕色，亚端线两侧