

- 后翅横脉无白点 ..... 9
9. 前翅暗灰色 ..... 10
- 前翅褐色 ..... 12
10. 环纹、肾纹可见 ..... 11
- 环纹、肾纹不清晰 ..... 旗眉夜蛾 *P. mandarina*
11. 前翅褐色带紫灰 ..... 浓眉夜蛾 *P. trimantesalis*
- 前翅暗紫灰色 ..... 隐眉夜蛾 *P. suaveola*
12. 前翅浅褐色 ..... 中影眉夜蛾 *P. curtalis*
- 前翅暗褐色 ..... 23
13. 前翅亚顶斑白色 ..... 14
- 前翅亚顶斑非白色 ..... 15
14. 前翅外线后半直斜 ..... 饰眉夜蛾 *P. ornata*
- 前翅外线后半波曲 ..... 缘斑眉夜蛾 *P. costinotata*
15. 前翅端区翅脉深褐色 ..... 16
- 前翅翅脉与翅一色 ..... 17
16. 前翅4脉有黑纹 ..... 纱眉夜蛾 *P. textilis*
- 前翅4脉无黑纹 ..... 白痣眉夜蛾 *P. albistigma*
17. 后翅中室端有白点 ..... 18
- 后翅中室端无白点 ..... 19
18. 肾纹由白点组成 ..... 遮眉夜蛾 *P. semilistigma*
- 肾纹无白点 ..... 点眉夜蛾 *P. vasava*
19. 前翅亚顶斑明显 ..... 20
- 前翅亚顶斑几不可见 ..... 22
20. 前翅亚端线前段白色 ..... 灰眉夜蛾 *P. cana*
- 前翅亚端线无白色 ..... 21
21. 前翅外线衬白色 ..... 褐翅眉夜蛾 *P. adusta*
- 前翅外线不衬白色 ..... 二斑眉夜蛾 *P. saucia*
22. 前翅外缘微锯齿形 ..... 苹眉夜蛾 *P. obscurata*
- 前翅外缘非锯齿形 ..... 蛛眉夜蛾 *P. tipula*
23. 前翅亚顶斑明显 ..... 暗影眉夜蛾 *P. disruptalis*
- 前翅亚顶斑不明显 ..... 波眉夜蛾 *P. prophyrea*

### 鳞眉夜蛾 *Pangrapta squamea* (Leech) (图版 LXIV-32)

*Zethes squamea* Leech, 1900, Trans. ent. Soc. Lond. p. 601. (湖北长阳)

*Pangrapta squamea*: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 407, pl. 74d. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 378. —Chen, 1992, in Peng, Icon. For. Ins. Hunan p.1032.

翅展 56—60 mm。头部黑灰色，下唇须外侧黑褐色；胸部背面黑灰色，足跗节外侧黑褐色，各节间有灰白斑；前翅黑棕色，前缘区灰白色，自近基部向顶角逐渐扩展，基线黑色，自前缘脉外弯至亚中褶，内线黑色，粗而模糊，自前缘脉外斜至亚中褶，折角内斜，环纹灰色，肾纹灰色，边缘黑棕色，不明显，中线模糊黑色，自前缘脉外斜至中褶后折角内斜，后端与内线合并，折角处有一黑色纵纹外伸至翅外缘，外线黑色，前端较粗，自前缘脉外斜至 6 脉，折角内斜，亚端线白色，外侧色暗褐，自前缘脉微曲外斜至 5 脉折向内弯，后段内侧暗褐色，外线与亚端线折角处的前方灰白色成一大斑块；后翅黑棕色，横脉纹浅黄色，由一黑线分割为二，中、外线黑色，亚端线白色锯齿形外弯；腹部黑棕色。

**分布** 河南、湖北、浙江、云南。

### 郁眉夜蛾 *Pangrapta ingradata* (Leech) (图版 LXIV-33)

*Zethes ingradata* Leech, 1900, Trans. ent. Soc. Lond. p. 602. (中国西部: Pu-tsu-fong)

*Pangrapta ingradata*: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 407.

翅展 32 mm。头部与胸部浅褐色杂白色，触角基节有白斑，下唇须细长，第一、二节外侧深褐色，第三节杂有灰白色，足外侧褐色，跗节各节间有白斑；前翅浅褐白色，布有褐色细点，基线褐色，较粗，自前缘脉外斜至中室，内线褐色外弯，在前缘区粗而外斜，在中室内凸，其后微弱并波曲，环纹小，微黄，有模糊褐边，近圆形，中线粗，褐色，自前缘脉微曲外斜至肾纹前端，再自 3 脉基部内弯至翅后缘，肾纹淡黄色，暗褐边，中有一暗褐纹，外线双线暗褐色，自前缘脉外斜至 6 脉，此后内一线极微弱，外一线波曲外弯，4 脉后内弯，双线间及内侧带褐色，线外侧另有一模糊褐线，亚端线淡黄色，外侧衬少许褐色，锯齿形，在 6 脉处外凸，外线前段外方有一近半圆形灰白斑，其后缘达 6 脉；后翅褐白色，布有黑褐细点，内线黑褐色，粗而模糊，外线双线，内一线黑褐色，粗而模糊，在中褶后外弯，外一线褐色，不明显，亚端线淡黄色，锯齿形，两侧衬黄褐色，中段两侧有较密的黑褐点，翅外缘波浪形；腹部浅褐灰色，布有黑褐细点，后几节背面带深棕色。

**分布** 四川。

### 紫褐眉夜蛾 *Pangrapta pulverea* (Leech) (图版 LXV-1)

*Zethes pulverea* Leech, 1900, Trans. ent. Soc. Lond. p. 603. (九江)

*Pangrapta pulverea*: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 407, pl. 74d.

翅展 30 mm。头部与胸部浅紫褐色，下唇须与足外侧有细灰白点；前翅浅紫褐色，基线褐色，波浪形外弯，自前缘脉至亚中褶，内线褐色，微波曲外弯，后半模糊，环纹只现一褐点，肾纹隐约可见一暗曲纹，中线褐色，模糊，自前缘脉外斜至肾纹前，自