

浓眉夜蛾 *Pangrapta trimantesalis* (Walker) (图版 LXV - 6)

Egnasia trimantesalis Walker, [1859] 1858, List. Spec. Lep. Colln Br. Mus. 16: 220. (Bengal)

Saraca trimantesalis: Leech, 1889, Proc. zool. Soc. p. 567.

Zethes trimantesalis: Leech, 1900, Trans. ent. Soc. p. 596.

Pangrapta trimantesalis: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 406. ——Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 171. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 377. ——Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 876.

翅展 34 mm。头部暗红褐色，下唇须褐灰色；胸部暗红褐色，足跗节外侧有灰白斑；前翅浓褐色带灰色，密布黑褐色细点，基部色暗褐，基线黑色，波浪形，自前缘脉至亚中褶，外侧衬灰色，内线黑色，波浪形外弯，在中室处明显内凸，环纹褐灰色，边缘黑褐色，小而圆，肾纹色似环纹，小而模糊，中线黑褐色，自前缘脉外斜至肾纹前端，自肾纹后端内斜并微波浪形，外线黑褐色，自前缘脉外斜至 6 脉，折角波曲内斜，前段外方有一近半圆形灰色大斑，后端一黑褐波浪形线，亚端线黑褐色间断，顶角一灰白斜纹；后翅灰褐色，各横线黑褐色，外线双线波浪形，亚端线间断，内线一细褐线；腹部棕褐色。

分布 江苏、浙江、福建、云南；日本，朝鲜，印度，孟加拉国。

隐眉夜蛾 *Pangrapta suaveola* Staudinger (图版 LXV - 7)

Pangrapta suaveola Staudinger, 1888, Stett. ent. Zeit. 49: 281. (SE Siberia)

Pangrapta suaveola: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 410, pl. 71h. ——Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 876. ——Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 148, pl. 15, fig. 291.

翅展 32 mm。头、胸暗褐色；前翅紫灰带褐色，基线黑褐色，自前缘脉外斜至中室，内线棕色，微外弯，在中室处内凸，环纹黄色，黑褐边，圆形，贴近内线，肾纹黄褐色，黑褐边，外线双线黑褐色，自前缘脉外斜至 6 脉后折向内斜，在亚中褶处稍外弯，线内方有一褐色较宽带，前端外方有一灰白色三角形斑，亚端线不明显，褐色，顶角有一灰色小斑，缘毛赭黄色，端部白色与暗褐色相间；后翅紫灰色带褐色，内线黑褐色，横脉纹为一黑褐窄条，外线双线黑褐色，内一线细而清晰，亚端线淡赭黄色，不清晰，两侧衬褐色，波浪形，缘毛似前翅；腹部赭黄色，背面杂有深褐色。

分布 黑龙江；西伯利亚。

中影眉夜蛾 *Pangrapta curtalis* (Walker) (图版 LXV - 8)

Egnasia curtalis Walker, [1866] 1865, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 34: 1177. (上海)