

Diapolia umbrosa: Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 171. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 407, pl. 71g. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 377. —Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 877.

翅展 33 mm。头部灰褐色，雄蛾触角有细纤毛丛，下唇须长向上弯曲，超过头顶，头顶布有黑点，下唇须第三节基部与端部灰白色；胸部背面灰褐色，布黑细点，足跗节外侧黑色，各节间有灰白斑；前翅淡褐色，带有紫灰色，基线褐色，自前缘脉外弯至亚中褶，内线褐色，波浪形外弯，在中室处明显内凸，环纹小，黄褐色黑边，肾纹窄小，橙黄色，边缘褐黑色，中央有一黑曲纹，中线黑褐色，自前缘脉外斜至中室下角，折角波曲内斜，外线黑色，自前缘直线外斜至 6 脉，折角波曲内斜，前半外方一灰白三角形大斑，其前缘有黑纵条，亚端线黑褐色锯齿形，前端外侧一白斜纹，内侧一黄白曲纹及一片黄褐色；后翅浅褐带紫灰色，各横线黑棕色，外线双线，后半锯齿形，亚端线仅后段可见波浪形；腹部灰褐色。

分布 陕西、浙江、湖北、江西、海南、云南；日本。

点眉夜蛾 *Pangrapta vasava* (Butler) (图版 LXV-16)

Egnasia vasava Butler, 1881, Trans. ent. Soc. Lond. p. 582. (日本横滨)

Pangrapta incisa Staudinger, 1888, Stett. ent. Z. 49: 278.

Pangrapta vasava: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 409. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 378. —Sugi, 1982, in Inoue *et al.*, Moths Jap. 1: 877.

翅展 23 mm。头、胸、腹及前翅褐色杂灰色；前翅内线内方色暗，基线、内线白色，环纹、肾纹黄褐色黑边，前者小，中线黑色波浪形，前端内侧灰白色，外线黑色，在 7 脉折角波浪形内弯，后段外斜，前段外方一灰白三角形斑，端线黑褐色；后翅色同前翅，中线仅后半明显黑褐色，中室端有四个黑边圆形小白斑，外线双线黑色锯齿形，外侧衬白色，后半锯齿形，端线黑褐色；腹部腹面灰白色。

寄主 榆。

分布 黑龙江、山东、河南、江苏、湖北；日本，朝鲜。

灰眉夜蛾 *Pangrapta cana* (Leech) (图版 LXV-17)

Zethes cana Leech, 1900, Trans. ent. Soc. p. 592. (九江, 宁波)

Pangrapta cana: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 406. —Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 171. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 377.

翅展 28 mm。头部与胸部褐灰色，下胸白色，布有黑棕色细点，足跗节外侧黑色，各节间有灰白斑；前翅褐灰色，布有暗褐细点，基线深褐色，自前缘脉至中室后缘，内线深褐色，自前缘脉波曲外斜至亚中褶折角内斜，环纹灰色，边缘黑褐色，肾纹白色，边缘黑褐色，中央有一黑曲纹，外线双线黑褐色，自前缘脉微曲外斜至 7 脉折角内斜，