

标本,剥制时发现乳房还有乳汁流出,尚在哺乳期。母兽在产仔前觅寻岩穴、乱石、倒木或草丛的凹处作窝,窝构造极简单,仅为一平缓的凹处,内铺设一点干草和自己身上的落毛。每胎2—4仔,初生幼仔体重550—750克,刚出生的幼仔眼闭,约至10日左右方睁眼。母兽哺育幼兽时间不长,约1年幼兽即可离开亲兽营独立生活。幼兽两、三年后性成熟。寿命10—20年。

豹偶然会遭到豺的攻击,1965年1月在江西峡江县境内曾发现成群的豺将50余公斤的豹咬死。除豺外,它几乎无其他天敌。它不敢袭击野牛、象、虎等猛兽,也很少去攻击牛、马、骡、鹿等大型有蹄类动物。

经济意义 豹在我国分布较广,数量亦多,由于人类经济活动频增、农作区不断扩大,因而豹的活动区域大大缩减了。豹的食物包括鹿、麂、麝、麝、羊和鸡等都是人们的狩猎经济动物。有时,还因豹进入村庄盗食家畜、家禽,故一直把它作为害兽来捕打和消灭。目前,豹在我国的数量已急剧下降。从毛皮收购量来看;七十年代的毛皮产量约为六十年代的20%。过去许多有豹的地区,现已绝迹。大部分地区亦已濒于绝灭状态。

自1959年起我国曾将北方所产的豹定为国家第二类保护禁猎动物。

现在,我国有些省和地区已将豹划为本省、区禁猎的稀少动物。

豹是深受欢迎的展览观赏动物。我国几乎各地动物园皆有展出。

豹皮美丽,供制高级华丽的皮大衣。另外,头、爪、尾齐全的可将头部填充标本状,铺挂起来作为装饰品。

豹皮以云贵高原所产为佳,色泽深黄、斑点清晰,黑黄鲜明。

豹骨是我国传统的药材,其作用与虎骨相同,但价值较虎骨便宜。

亚种 豹的亚种分化颇多,总计约有20余个,根据记载我国有3个亚种。

(1) 华南亚种 *Panthera pardus fusca* Meyer

1794 *felis fusca* Meyer, Zool. Ann. 1:394 (模式产地: 孟加拉)。

1912 *Felis pardus variegata* G. Allen, Mem. Mus. Comp. Z. Harvard 40:235. Not of Wagner, 1841 (模式产地: 湖北长阳)。

分布于云南西双版纳、泸水、丽江、金平、屏边、河口, 贵州梵净山(松桃、江口、印江), 四川会东、巴塘、泸定、雅安、宜宾、万源、峨眉、苍溪、巴县、内江、乐至、綦江、沐川、、绵阳等地, 西藏珠穆朗玛峰地区、年楚河以东、察隅、洛隆、波密, 青海玉树、果洛州南部, 湖南, 广西西南部的睦边、靖西、龙津、宁明, 上思, 广东, 湖北, 安徽歙县、宁国、休宁、永宁, 至德、广德、青阳、宣城等, 福建平和, 浙江金华, 陕西紫阳、白河、填平、商县、石泉; 江西峡江、高安、宜黄、景德镇、新建、永丰、会昌、南城、新余、贵溪、安义, 河南豫南山区(桐柏)、桐柏山和大别山一带。

个体稍小,冬毛短,棕黄色,黑色花纹清晰,黑黄相映格外鲜明。