

(2) 华北亚种 *Panthera pardus fontanieri* Milne-Edward

- 1867 *Felis fontanieri* Milne-Edwards. Ann. Sci. Nat. Zool. 8:375 (模式产地: 北京附近)。
 1867 *Leopardus chinensis* Gray, Proc. Zool. Soc. 264. (Not *Felis chinensis* Gray, 1837) (模式产地: 北京西山)。
 1907 *Panthera hanensis* Matschie, Wiss. Ergebni. Exped. Filchner to China, 10, I:198 (模式产地: 安康)。
 1930 *Panthera pardus bedfordi* Pocock, J. Bombay N. H. Soc. 34:323 (模式产地: 陕西商县)。

分布于河北沙城、围场,北京昌平、延庆、门头沟、密云,山西太原、晋中、雁北、吕梁、晋东南、临汾、运城,陕西延安地区中部、西北部。

个体较大。冬毛较长,毛色黄,腹面乳白色。

(3) 东北亚种 *Panthera pardus orientalis chlegel*

- 1857 *Felis orientalis* Schlegel, Handl. der Dierkunde, I:23 (模式产地: 朝鲜)。
 1903 *Felis villosa* Bonhote, Ann. Mag. N. H. 11:475 (模式产地: 黑龙江)。

分布于: 黑龙江宝清、牡丹江、东宁、穆棱, 吉林汪清、珲春、和龙、敦化、延吉、安图、长白、集安、抚松、通化、靖宇、浑江、柳河、辉南、蛟河、舒兰、桦甸, 内蒙古科右前旗。

个体大。毛长,底绒较丰厚,毛色淡黄,腹面白色。黑色环圈较大。

54. 虎 *Panthera tigris* Linnaeus (图版十, 图 2)

- 1758 *Felis tigris* Linnaeus, Syst. Nat. 10th ed. 1:41. (模式产地: 孟加拉)。

别名: 老虎、大虫、扁担花(四川)、打哈(藏)。

鉴别特征 全身呈淡黄或黄色,并布满黑色横条纹。体大而雄伟,头圆、颈粗短。四肢强壮有力,具硬爪。

形态

外形: 体长 1.2—2 米,尾长 1 米左右,体重 100—200 公斤,最重可达 320 公斤。

头圆大。吻部较短,鼻端裸露,呈乳白色或肉色,其边缘为黑色。舌的上表面长有许多角质倒刺,底部大而软,端部尖而硬,长约 5 毫米左右。舌尖和舌缘的刺软而小似肉突。嘴旁长有白色间有黑色的硬须,须长达 150 毫米。眼虹膜呈绿褐色,光强时瞳孔缩成小圆状,夜晚光亮照耀下可有绿色磷光闪射。

颈部粗而短,几与肩宽。肩、胸、腹和臀部均较窄,呈侧扁状。

四肢中等长,强壮有力,前肢较后肢粗大,前足 5 趾、后足 4 趾,前足亦较后足宽大,成体有 250 毫米长,140 毫米宽。趾、掌下为较柔软的足垫,垫的表面无毛。趾前具镰刀形角质硬爪,爪为灰白色的半透明状。平时,爪收缩在爪壳内。趾间和趾、掌间具毛。

腹下有 3 对乳头。