

东北虎体形最大。毛长而厚,色最浅呈淡黄色,腹面、四肢内侧、尾下为乳白色。黑色条纹较窄。

(3) 华北亚种 *Panthera tigris coreensis* Brass

1904 *Felis tigris coreensis* Barss, Nutzbare Tiere Ostasiens, 4 (模式产地: 朝鲜)。

分布河北的东陵附近(兴隆、围场),河南北部山地(晋豫边界),山西北部,管涔山、恒山、云中山、五台山、中条山一带,甘肃会宁。

体较大,毛较长,色黄稍深。

(4) 西北亚种 *Panthera tigris lecoqi* Schwarz

1916 *Panthera tigris lecoqi* Schwarz, Zool. Anz. 47:351 (模式产地: 罗布泊)。

分布新疆罗布泊、博斯腾湖附近、塔里木河沿岸。

(5) 华南亚种 *Panthera tigris amoyensis* Hilzheimer

1905 *Panthera tigris* var. *amyensis* Hilzheimer, Zool. Anz. 28:598 (模式产地: 汉口附近)。

1929 *Panthera tigris styani* Pocock, J. Bombay N. H. Soc. 33:531 (模式产地: ? 华北)。

分布福建福清、南平、厦门、尤溪、仙游,安徽安庆,江苏,贵州梵净山地区、桐梓,浙江,湖南长沙、宁乡、来阳、洞口、晃县,湖北汉口、长阳、巴东,四川万县、宜宾、彭水、武隆、石柱、南川、古蔺、凉山、雅安、乐山、绵阳、绵竹、达县、涪陵、城口、名川、青川、平武,江西九江、瑞昌、武宁、黎川、南城、上饶、龙南、信丰等,广东乳源、连山、阳山、信宜、阳春,陕西秦岭地区(佛坪)。

体小,毛短密,色深呈棕黄,条纹较宽。

(6) 云南亚种 *Panthera tigris corbetti* Mazak

1968 *Panthera tigris corbetti* Mazak, Mammalia 32, 1:104—112 (模式产地: 越南)。

分布云南西双版纳、思茅,广西西南部。体较小,毛的底色深棕,毛亦短,条纹多,短而稀窄,条纹经腹下似环绕。

XXXIII. 雪豹属 *Uncia* Gary, 1854

1854 *Uncia* Gray. Ann. Mag. N. H. 14:394.

参阅: 阿部余四男, 1944, 79—80; 寿振黄, 1955, 83, 116; 中国科学院动物研究所兽组, 1958, 8, 12; 汪松, 1962, 172; 寿振黄, 1962, 411—413; 张浩等, 1963, (1), 127, 131, 134; 郑作新, 1964, 321; 中国科学院青海甘肃综合考察队, 1964, 9, 23, 76; 钱燕文等, 1965, 172; —, 1972, 22, 59; Simpson, 1945, 120; Ellerman & Morrison-Scott, 1951, 320; Новиков, 1956, 274—277。