

Epizeuxis pryeri: Ogata, 1958, in Esaki, Icon. Het. jap. p. 194.

Paracolax pryeri: Owada, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 921, pl. 225, fig. 15.




图 690 黄肾奴夜蛾 *Paracolax pryeri* (Butler) ♂ 外生殖器

翅展 20 mm。头部暗灰褐色，雄蛾触角线形，有鬃毛，下唇须向上弯，似镰刀状，远超过头顶；胸部背面暗灰褐色；前翅暗灰褐色带紫色，内线黑色，较粗，直线内斜，在中室之前不甚明显，环纹黄色黑边，中线黑色，自中室内斜至翅后缘，似一带状，肾纹淡黄色，较窄，外线黑色，较粗，在前缘脉后微折曲，其后近直线内斜，仅在中褶处稍内凹，亚端线黄白色，内侧衬较宽的黑色，似一带状，在 7 脉折角内斜，线外侧另一黑内斜线，一黑纹自顶角内斜至亚端线折角处，端线为一列黑点；后翅暗灰褐色，中、外线黑色，前半均不显，亚端线黄白色，内侧衬较宽黑色；腹部暗灰褐色。雄蛾抱器瓣长，无附件，阳茎短，无角状器（图 690）。

寄主 杉树枯叶。

分布 浙江、湖南、福建；日本。

斜线奴夜蛾 *Paracolax pacifica* Owada (图版 LXVII-28)

Paracolax pacifica Owada, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 922, pl. 225, figs. 13, 14, pl. 385, fig. 6 male genitalia. (日本)

翅展 24 mm。头部黑褐色，雄蛾触角线形，有鬃毛，下唇须外侧黑褐色，斜向上伸，约似镰刀状；颈板黑褐色；胸部浅赭色；前翅浅赭色微带紫色，基线、内线不显，环纹只现一黑褐点，中线黑褐色，较直内斜，肾纹黑褐色，极细窄，似一短曲线，外线隐约可见褐色，自前缘脉外弯至 4 脉后不显，亚端线黑褐色，极细弱，自前缘脉外弯，7 脉后微锯齿形内斜，一黑褐线自顶角直线内斜至翅后缘，其外侧衬黄色，翅外缘有一列黑点；后翅色似前翅，内线黑褐色，外线粗，黑褐色，直线内斜，外侧衬黄色，翅外缘有一列黑点；腹部浅赭色。