

线外侧衬灰色，内线内侧衬灰色，肾纹水滴状，白色，中线暗褐色，亚端线浅黄衬棕色，波浪形，顶角有一黑褐斑；后翅灰褐色；腹部灰棕色。雄蛾抱器腹延伸成一长突(图 444)。

寄主 榭、山毛榉。

分布 黑龙江、吉林、新疆；土耳其，欧洲。

伍夜蛾属 *Parastichtis* Hübner

Parastichtis Hübner, [1821] 1816, Verz. bek. Schmett. p. 213.

Type-species: *Noctua suspecta* Hübner.

Parastictus Agassiz, [1847] 1846, Nom. zool. Index Univ. p.274.

Dyschorista Lederer, 1857, Noct. Eur. p. 143.

Taeniosea Grote, 1874, Bull. Buff. Soc. nat. Sci. 2: 143.

喙发达，下唇须向上伸，第二节约达额之中部，第三节短，额光滑，复眼大，圆形，雄蛾触角线形；前、后胸有毛簇；腹部背面有一列毛簇；前翅稍窄长，有一副室；后翅 5 脉细弱。

伍夜蛾 *Parastichtis suspecta* (Hübner) (图版 XXVI-29)

Noctua suspecta Hübner, [1817], Samml. Eur. Schmett. 4: pl. 138, fig. 633. (欧洲)

Caradrina iners Treitschke, 1825, Schmett. Eur. 5 (2): 271.

Amathes iners: Hampson, 1906, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 6: 487.

Agrochola iners: Kostrowicki, 1956, Pol. ent. Soc. 27: 69. ——Chen, *et al.*, 1991, Noct.

Fn. Xizang p.225.

Parastichtis suspecta: Forster *et* Wohlfahrt, 1971, Schmett. Mitteleur. p. 219.

翅展 30mm。头、胸及前翅浅褐色，前翅基线黑色，内线双线黑色，环纹斜圆形，肾纹大，中凹，中线黑褐色，外线双线黑色，间断，亚端线浅黄色，间断；后翅灰褐色，前缘区浅黄色；腹部褐色。

寄主 桦、杨。

分布 青海、西藏；日本，蒙古，俄罗斯，欧洲。

亮冬夜蛾属 *Jodia* Hübner

Jodia Hübner, 1818, Zutr. Samml. exot. Schmett. p. 15.

Type-species: *Noctua croceago* [Denis *et* Schiffermüller].

Xanthia Boisduval, 1829, Ind. Meth. p. 84.

Lampetia Curtis, [1830] 1829, Guid. Br. Ins. p. 153.