

深灰褐色，隐见正面的线条，浅灰褐至灰褐色；外线黑褐色，在前缘处粗壮，向下逐渐变细，在 Cu_2 上方消失；中点深灰色细小。后翅反面灰白色，散布大量黑褐色鳞片，中点和外线黑褐色，前者较正面大。♂前翅反面毛束黑色；后翅反面后缘附近毛束浓密，黄白色。

雄性外生殖器（图 607）：钩形突约 2 倍长于背兜。阳茎基环侧突主支大毛 6 支。囊形突扁平弧形。抱器瓣基部狭窄，外中部宽，呈菱形。阳茎端膜的小刺中等大，较密集。

雌性外生殖器（图 610）：前阴片中部骨化带特别狭窄。骨环长宽约相等。囊片为横置的椭圆形，较小。

检视标本：7 ♂ 1 ♀，西藏樟木曲乡，3 300 m，1975. VII. 2—7；1 ♂，西藏吉隆托当，3 300 m，1975. VII. 4；1 ♀，西藏亚东，2 800 m，1975. VI. 4。

分布：西藏；印度，锡金，尼泊尔。

西南亚种 *subsp. chrysoprasis* (Oberthür, 1884) (图版 XV: 4)

Cidaria chrysoprasis Oberthür, 1884, Études d'Ent. 10: 34, pl. 1: 2. (四川：打箭炉)

Eustroma chrysoprasis: Leech, 1897, Ann. Mag. nat. Hist. (6) 19: 563.

Pareustroma chrysoprasis: Sterneck, 1928, Dt. ent. Z. Iris 42: 149.

Eustroma fissisignis chrysoprasis: Prout, 1937, in Seitz, Macrolepid. World 4 (Suppl.): 106.

Pareustroma fissisignis chrysoprasis: Prout, 1940, ibidem 12: 309, pl. 34: h.

前翅长：♂ 19—22 mm，♀ 23 mm。与指名亚种差异甚小，主要区别是后翅中室内桔黄色斑较大，其长度约 1.5—2 mm（指名亚种该斑长度小于 1 mm）。此外，前翅色略浅，线条略粗并较模糊。

检视标本：3 ♂，云南泸水姚家坪，2 500 m，1981. VI. 2、4；1 ♀，云南腾冲猴桥，1 680 m，1992. V. 31—VI. 1；7 ♂，云南腾冲胆扎林场，2 500 m，1992. VI. 2—4。

分布：四川、云南。

狭带叉突尺蛾 *Pareustroma propria* (Leech, 1897) (图版 XV: 5)

Eustroma propria Leech, 1897, Ann. Mag. nat. Hist. (6) 19: 564. (四川：打箭炉)

Pareustroma propria: Sterneck, 1928, Dt. ent. Z. Iris 42: 149.

前翅长：♀ 18 mm。额和头顶白色与黑褐色掺杂，头顶前半部黑褐色。下唇须粗壮，伸出额外部分略大于 1/3，深灰色，第二节端半部背面和第三节黄白色。胸腹部背面灰褐色，散布黑褐色，肩片灰白与黑褐色掺杂。前翅灰黄褐色，斑纹简单；基部有一极模糊的黑褐色斑；中域有一条狭窄黑褐色带，在前缘处较宽，内缘外倾，在中室中部



图 608—609 雄性外生殖器. 608. 秀叉突尺蛾 *Pareustroma aconisecta* Xue, sp. nov.;
609. 楔斑叉突尺蛾 *P. schizia* Xue, sp. nov.

和臀褶处各向外凸出一齿，其中臀褶处的齿横穿中带伸达其外侧边缘；中带外缘较直，在翅脉上微波曲；中带中部色较浅，由前缘至中室下缘有一条纤细黑色回纹；翅端部几乎无斑纹；缘线深褐色，缘毛灰褐与灰黄色掺杂。后翅灰白色，基部附近散布灰褐色；中点极弱；外线深灰褐色，在 M_3 以上锯齿状， M_3 以下微弯曲；翅端部近边缘处略带灰褐色，缘线和缘毛与前翅相同。翅反面灰黄色，散布灰褐色。前翅反面中带外缘以内带深灰褐色，其外侧紧邻一条深褐色锯齿状外线。后翅反面外线同正面。

本种雄性第二性征同前种，前翅反面毛束黑色，后翅反面后缘中部毛束淡黄色，后翅正面中室内具桔黄色小斑。

雌性外生殖器（图 611）：前阴片中部骨化带宽阔。骨环长宽约相等。囊片狭长带状，横置，两端稍下垂。

检视标本：1♀，四川泸定新兴，1 800 m，1983. VI. 13。

分布：四川。

秀叉突尺蛾 *Pareustroma aconisecta* Xue sp. nov. (图版 XV: 6)

前翅长：♂ 15 mm，♀ 16 mm。额和头顶灰黄褐色。下唇须侧面深褐色，背面和腹面灰黄褐色。♂ 触角纤毛极短。胸腹部背面灰褐色；中胸立毛簇发达，毛端白色。前翅灰红褐色，基部有一段黑褐色线，由前缘至中室下缘，其外侧紧邻一条黑褐色带，弧形，在中室下缘以下逐渐消失；中带黑褐色，其内缘弧形，在中室中央和臀褶处外凸成