

背斑重尾夜蛾 *Penicillaria dorsipuncta* (Hampson) (图版 XIII-26)

Bombotelia dorsipuncta Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 13, text fig. 7. (新加坡)

Bombotelia dorsipuncta: Gaede, 1937, in Seitz, Macrolep. World 11: 353, pl. 32b. —Barlow, 1982, Moths SE Asia, p. 90. —Holloway, 1985, Moths Borneo, p. 171.

翅展 25—28 mm。头、胸及前翅紫棕色，前翅后缘区基部带黑色，基线仅前端现一白纹，其余各横线白色，内线折角于中室，线内方色暗，中线外侧衬黑色，折角于肾纹内下角，肾纹窄，黑褐色白边，外线双线，后段波曲，内侧有黑斑，外一线中段一黑斑外伸至 3 脉端部，近三角形，其前缘灰白，后方有银蓝色，亚端线在 4—6 脉间不显，翅外缘一列黑点；后翅白色，前缘区和端区黑褐色，外线、亚端线可见，亚端线后段可见；腹部暗褐色，第四节背面一白斑。

分布 海南；菲律宾，新加坡，加里曼丹岛。

芒果重尾夜蛾 *Penicillaria jocosatrix* Guenée (图版 XIII-27)

Penicillaria jocosatrix Guenée, 1852, in Boisduval et Guenée, Hist. nat. Ins., Noct. 1: 304. (爪哇)




图 576 芒果重尾夜蛾 *Penicillaria jocosatrix* Guenée ♂ 外生殖器

Penicillaria jocosatrix: Holloway, 1985, Malay. Nat. J. 38: 169.

Bombotelia jocosatrix: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 11. —Gaede, 1937, in Seitz, Macrolep. World 11: 353. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 334.

翅展 22—24 mm。头、胸黑紫棕色，前翅带少许灰色，内线、外线黑色衬白，中部折角，亚端线白色，在 3、4 脉为锯齿形，中有一灰白条自中室中部至外缘；后翅白色，端区黑棕色，内侧有一列黑点；腹部暗棕色。雄蛾抱器腹延伸，左侧的较长（图 576）。

寄主 芒果、红果榄仁树。

分布 湖南、福建、广东、海南、广西、云南；印度，斯里兰卡，印度尼西亚，大洋洲。

解剖可见雄蛾外生殖器有大量长毛。