

Tibiocellaria Bethune-Baker, 1906, Nov. zool. 13: 231.

Bombotelia Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 6.

Tamseale Nye, 1975, Generic Names of Moths of the World 1: 470.

喙发达，下唇须向上伸，第二节约达额中部，额平滑，有长尖毛簇，复眼圆大，雄蛾触角一般在基半部栉形；腹部毛、鳞混生，颈板成脊，胸部有脊状小毛簇，胫节有长毛；腹部基部有鳞脊，中部几节有小毛簇，臀簇小，成对；前翅顶角略呈长方形，外缘在中段微弯，在3脉处折角内斜，有副室。

种 检 索 表

1. 雄蛾触角基半部双栉形 斑重尾夜蛾 *Penicillaria maculata*
雄蛾触角锯齿形 2
2. 雄蛾触角强锯齿形 3
雄蛾触角微锯齿形 背斑重尾夜蛾 *P. dorsipuncta*
3. 前翅外线在6脉外折曲 芒果重尾夜蛾 *P. jocosatrix*
前翅外线外弯至4脉后内弯 红棕重尾夜蛾 *P. simplex*

斑重尾夜蛾 *Penicillaria maculata* Butler (图版XII-25)

Penicillaria maculata Butler, 1889, Ill. Het. Br. Mus. 7: 71, pl. 130, fig. 5. (印度)

Bombotelia maculata: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 7. —Gaede, 1937, in Seitz, Macrolep. World 11: 352. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 334.

Penicillaria maculata: Holloway, 1985, Malay, Nat. J. 38: 172.

翅展 26—30 mm。头、胸暗褐色；前翅黄褐带紫棕色，基部为黑褐三角区，其外缘白色，基线黑色波浪形，内线双线棕色波浪形，中褶与亚中褶各一白线自内线伸至外缘，外线双线灰白色，在6脉折角，折角处一棕纹至外缘，亚端线灰色，外侧浓棕色；后翅白色，前缘紫棕色，端带宽，黑色，臀角一白色三角形小斑；腹部棕褐色。雄蛾抱器瓣窄长 (图 575)。

分布 四川、西藏；印度。




图 575 斑重尾夜蛾 *Penicillaria maculata*
Butler ♂ 外生殖器