

顶角有白斑，后缘区有大片云状白斑，基线、内线及外线均双线黑色，环纹及肾纹浅褐色，亚端线中段明显，近臀角有二白点；后翅白色，端区暗褐色；腹部黄褐色。雄蛾抱器瓣腹缘中凹，抱钩短（图 491）。

分布 湖北、福建、广东、海南、四川；印度。

环星夜蛾 *Perigea spicea* Guenée (图版 XXXI-11)

Perigea spicea Guenée, 1852, in Boisduval et Guenée, Hist. nat. Ins., Noct. 1: 226. (爪哇)

Perigea spicea: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 348. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 260.

翅展 22mm。头部暗棕带褐色；胸部灰白带暗褐色；前翅黄褐色，顶角至后缘中部为一斜界，其外方赭棕色，后缘黑褐色，基线黄色弯曲，在前缘脉及中室为黑点，内线不清晰，环纹黄色，中央有一黑点，肾纹大，有明显的黄色边缘，中部两侧内凹，中央有褐纹，中室下角外有一黑斑，外线双线褐色，外侧有一列黑边小白点，亚端线暗灰褐色，端线为一列黑点；后翅白色微带褐灰色；腹部浅褐灰色。

分布 江苏、福建、广东、海南；印度，斯里兰卡，印度尼西亚。

暗端星夜蛾 *Perigea rectivitta* (Moore) (图版 XXXI-12)

Orthosia rectivitta Moore, 1881, Proc. zool. Soc. p. 353. (锡金)

Perigeodes rectivitta: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 291. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 259.

翅展 42—48mm。头、胸及前翅浅褐色，前翅前缘区大部、中区后半及外区大部带污褐色，基线、内线均双线黑色波浪形，剑纹小，黑点状，环纹及肾纹浅赭黄色，中线不清晰，外线双线黑褐色，外侧一列白点，亚端线不明显，暗褐色外衬赭黄，在 2、3 脉处为外突齿；后翅暗褐；腹部黄褐色。

分布 海南、云南；锡金，印度。

三圈星夜蛾 *Perigea tricycla* Guenée (图版 XXXI-13)

Perigea tricycla Guenée, 1852, in Boisduval et Guenée, Hist. nat. Ins., Noct. 1: 226. (Bengal)

Perigeodes tricycla: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 289. Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 259.

翅展 38—44mm。头部黄色；胸部白色带灰棕色；前翅暗黄微带褐色，后缘灰色，外区灰褐色，基线只前端现双黑点，内线双线黑色，锯齿形，间断，剑纹仅端部可见，环纹不规则圆形，肾纹 8 字形，后外侧二黑点，外线双线褐色锯齿形，齿尖为黑、白点，亚端线浅黄色波浪形，顶角一斜棕纹，在 6 脉折曲，其外方成一灰色斜方形区，臀角一黑褐纹；后翅与腹部烟褐色。

分布 四川；印度，孟加拉国。

污星夜蛾 *Perigea turpisoides* Poole (图版XXXI-14)

Perigea turpisoides Poole, 1989, Lep. Cat. Noct. p. 787. (巴布亚新几内亚)

Perigea turpis Warren, 1912, Nov. zool. 19: 34. (preoccupied)

翅展 32mm。头部黄褐杂褐色；胸部灰黄杂褐色；前翅灰黄色，密布棕色细点，基线双线棕色，环纹只现一棕色点，1脉后方灰白色，中室一棕色近方形斑，中室端部后方一黄斑，其中有褐环，亚端线棕色带状，前端尖楔形；后翅灰褐色；腹部黄褐色。

分布 西藏；巴布亚新几内亚。

霉星夜蛾 *Perigea olivacea* Warren (图版XXXI-15)

Perigea olivacea Warren, 1912, Nov. zool. 19: 33. (锡金)

Perigea olivacea: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 124.

Perigeodes olivacea: Chen *et al.*, 1991, Noct. Fn. Xizang p.251.

体长 15mm；翅展 38mm。头部黄色杂褐色，下唇须外侧褐色，下缘黄褐色；胸部背面黄褐色，颈板基部、端部及两侧褐色，翅基片内缘红棕色；前翅淡黄色，基线、内线及中线均不明显，亚中褶基部有一褐点，环纹褐灰色，不清晰，4—5脉基部之间有一棕色点，外线外方褐色，但不达顶角，1脉后棕褐色，臀角处色最深，端线由一系列褐点组成；后翅灰褐色；腹部灰黄色。

分布 西藏（墨脱背崩）；锡金；印度。

晕星夜蛾 *Perigea magna* (Hampson) (图版XXXI-16)

Xanthoptera magna Hampson, 1894, Fn. Br.

Ind. 2: 320. (锡金；印度)

Perigeodes magna: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 289. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 259.

翅展 38—44mm。头部黄褐色；胸部暗褐杂灰色；前翅赭色带红褐色，前缘区赭黄带霉绿色，后缘区灰色，外区和端区带紫红色，顶角一红褐纹内斜至外线，基线、内线由黑点组成，环纹及肾纹由黑点围成，外线在翅脉上为双黑点，杂有白点，亚端线后半可见几个微白纹；后翅暗褐色微带红色；腹部褐灰色。雄蛾抱器瓣端窄尖，抱钩极长




图 492 晕星夜蛾 *Perigea magna* (Hampson)

♂ 外生殖器