

分布 四川；印度，孟加拉国。

污星夜蛾 *Perigea turpisoides* Poole (图版XXXI-14)

Perigea turpisoides Poole, 1989, Lep. Cat. Noct. p. 787. (巴布亚新几内亚)

Perigea turpis Warren, 1912, Nov. zool. 19: 34. (preoccupied)

翅展 32mm。头部黄褐杂褐色；胸部灰黄杂褐色；前翅灰黄色，密布棕色细点，基线双线棕色，环纹只现一棕色点，1脉后方灰白色，中室一棕色近方形斑，中室端部后方一黄斑，其中有褐环，亚端线棕色带状，前端尖楔形；后翅灰褐色；腹部黄褐色。

分布 西藏；巴布亚新几内亚。

霉星夜蛾 *Perigea olivacea* Warren (图版XXXI-15)

Perigea olivacea Warren, 1912, Nov. zool. 19: 33. (锡金)

Perigea olivacea: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 124.

Perigeodes olivacea: Chen *et al.*, 1991, Noct. Fn. Xizang p.251.

体长 15mm；翅展 38mm。头部黄色杂褐色，下唇须外侧褐色，下缘黄褐色；胸部背面黄褐色，颈板基部、端部及两侧褐色，翅基片内缘红棕色；前翅淡黄色，基线、内线及中线均不明显，亚中褶基部有一褐点，环纹褐灰色，不清晰，4—5脉基部之间有一棕色点，外线外方褐色，但不达顶角，1脉后棕褐色，臀角处色最深，端线由一系列褐点组成；后翅灰褐色；腹部灰黄色。

分布 西藏（墨脱背崩）；锡金；印度。

晕星夜蛾 *Perigea magna* (Hampson) (图版XXXI-16)

Xanthoptera magna Hampson, 1894, Fn. Br.

Ind. 2: 320. (锡金；印度)

Perigeodes magna: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 289. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 259.

翅展 38—44mm。头部黄褐色；胸部暗褐杂灰色；前翅赭色带红褐色，前缘区赭黄带霉绿色，后缘区灰色，外区和端区带紫红色，顶角一红褐纹内斜至外线，基线、内线由黑点组成，环纹及肾纹由黑点围成，外线在翅脉上为双黑点，杂有白点，亚端线后半可见几个微白纹；后翅暗褐色微带红色；腹部褐灰色。雄蛾抱器瓣端窄尖，抱钩极长




图 492 晕星夜蛾 *Perigea magna* (Hampson)

♂ 外生殖器