

色，边缘黑褐色；中胸背中线两侧排列四个白点，后胸和第一、二腹节背中线上各有一个白点。腹部灰褐色。前翅散布细小白点，前缘和外缘的白点列清晰整齐，基部一个、中域两个、近外缘处三个白点较大，直径约1—1.5 mm。后翅基部浅灰色，向端部颜色逐渐加深，可见微小深灰色中点和浅色波状外线；缘线和缘毛有小白点。翅反面深灰褐色至黑灰色，前翅白点较模糊，后翅中点较大，周围有浅色圈，其外侧有三条白线。

雄性外生殖器（图 1108）：钩形突刺状，较细小。囊形突短，中央凸伸一尖角。抱器瓣短宽，抱器背端部略隆起，抱器腹分化不明显，边缘不规则波曲，具一弱小刺状端突。

检视标本：1 ♂，云南云龙志奔山，2 430 m，1981. VI. 20；1 ♂，云南腾冲胆扎林场，2 500 m，1992. VI. 2—4。

分布：云南；尼泊尔，锡金。

白带周尺蛾 *Perizoma albofasciata* (Moore, 1888) (图版 XXIII: 24)

Cidaria albofasciata Moore, 1888, in Hewitson & Moore, Descr. new Indian lepid. Insects Colln late Mr W. S. Atkinson: 277. (印度：大吉岭)

Larentia albofasciata: Hampson, 1895, Fauna Br. India (Moths) 3: 374.

Cidaria (Perizoma) albofasciata: Prout, 1914, in Seitz, Macrolepid. World 4: 259, pl. 7: h.

Perizoma albofasciata: Prout, 1939, ibidem 12: 277.




图 1109—1112 雌性外生殖器. 1109. 小周尺蛾 *Perizoma parvaria* (Leech); 1110. 愚周尺蛾 *P. fatuaria* (Leech); 1111. 白带周尺蛾 *P. albofasciata* (Moore); 1112. 对点周尺蛾 *P. antisticta* (Prout)

前翅长：♀1 mm。头和体背黑褐色，头掺杂白鳞，下唇须尖端伸达额外。后胸和第一腹节背面大部白色。前翅灰褐色，亚基线、中线和外线为灰白色双线，各双线之间的灰褐色细线不完整；中点黑色粗大，其外侧紧邻一宽阔灰白色带，该带扩展至外线，中部穿过外线到达外缘；亚缘线灰白色波状，极细弱，在 M_3 处扩大成一模糊白斑；缘线为一列细小黑点，缘毛深灰褐色掺杂少量灰白色。后翅灰白色，有深灰色中点和外线；缘线深灰褐色纤细，缘毛灰白色掺杂少量深灰褐色。前翅反面灰褐色，隐见正面斑纹。后翅反面灰白色，散布褐鳞，中点、外线和亚缘线深灰褐色。后翅中室端脉中等强度双折角。

雌性外生殖器（图 1111）：前表皮突较短，后表皮突特别细长。前阴片横带样骨化，两侧向上扩展。囊导管极短粗，中下部骨化。囊体小袋状，向侧面扭曲，无囊片。

检视标本：1♀，西藏樟木曲乡，3 300 m，1975. VII. 9。

分布：四川、西藏；印度，缅甸，锡金。

对点周尺蛾 *Perizoma antisticta* (Prout, 1938) 中国新记录 (图版 XXIII: 25)

Cidaria (*Perizoma*) *antisticta* Prout, 1938, in Seitz, Macrolepid. World 4 (Suppl.): 164, pl. 16: a.
(巴基斯坦：旁遮普)

Perizoma antisticta: Prout, 1939, ibidem 12: 278.

前翅长：♀12—13 mm。头和体背黑褐色，后胸背中线上有一白点。下唇须约 1/4 伸出额外。前翅深灰褐色至黑灰色，亚基线和中线为向外倾斜的细带，其中亚基线倾斜较多，中线不完整；外线波状，仅见轮廓；亚缘线灰白色极细弱，但其中部形成一模糊灰白色或灰黄色大斑，为本种特征；缘线较翅面色略深，缘毛与翅面同色。后翅灰白色，隐见深灰色中点和外线。前翅反面灰褐色，隐见正面斑纹。后翅反面色较灰，中点和外线清晰，后者细带状。后翅中室端脉强烈双折角。

雌性外生殖器（图 1112）：近似前种。前表皮突特别短。囊导管较细长，骨化。囊体细长袋状，上端略有弱骨化，无囊片。

检视标本：7♀，西藏吉隆托当，3 300 m，1975. VIII. 3、4；1♀，西藏波密扎木，2 750 m，1973. IX. 19。

分布：西藏；巴基斯坦。

明周尺蛾 *Perizoma lucifrons* Prout, 1926

Perizoma lucifrons Prout, 1926, J. Bombay nat. Hist. Soc. 31: 309. (缅甸：克钦丘陵)

Cidaria (*Perizoma*) *lucifrons*: Prout, 1938, in Seitz, Macrolepid. World 4 (Suppl.): 164.

分布：四川；缅甸，锡金。

中国分布下述亚种。