



图 1117—1118 雄性外生殖器。1117. 枯斑周尺蛾 *Perizoma fulvamacula fulvamacula* (Hampson); 1118. 序周尺蛾 *P. seriata seriata* (Moore)

分布：台湾、湖北、华西。

序周尺蛾 *Perizoma seriata* (Moore, 1888)

Cidaria seriata Moore, 1888, in Hewitson & Moore, Descr. new Indian lepid. Insects Colln late Mr W. S. Atkinson: 278. (印度：大吉岭)

Larentia seriata: Hampson, 1895, Fauna Br. India (Moths) 3: 373.

Cidaria (Perizoma) seriata: Prout, 1914, in Seitz, Macrolepid. World 4: 259, pl. 7: h.

Perizoma seriata: Prout, 1939, ibidem 12: 279.

分布：台湾、四川、云南、西藏；印度，锡金。

中国西南地区和台湾分别分布下述两亚种。

指名亚种 *subsp. seriata* (Moore, 1888) (图版 XXIII: 31)

前翅长：♂ 10 mm, ♀ 11—12 mm。头和体背黑褐色，下唇须较前种略长。前翅暗黄褐色，基斑和中带黑褐色，中带较前种略宽，两侧浅色带不明显，外缘（外线）在 R_5 处有一凸角，其下略内倾，微波曲至后缘；亚缘线为一列白点，在 M_3 以下扩大为一宽大鲜明的白斑，白斑上半部圆，下半部逐渐窄缩，下端接近后缘；缘线有一列细小黑点，缘毛深灰褐色。后翅、翅反面和后翅中室端脉同前种。