

线，端线褐色；后翅黄白微带浅褐色，隐约可见亚端线；腹部黄白带灰色。

分布 河北、山东；日本，印度，不丹，缅甸，印度尼西亚，亚洲西部，大洋洲，非洲，欧洲。

裴夜蛾属 *Perynea* Hampson

Perynea Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 201.

Type-species: *Rivula subrosa* Butler.

喙发达，下唇须斜向上伸，第三节小，平伸，额有尖锥形突，复眼大，触角线形；胸部主要被鳞片，胫距长；前翅顶角稍尖，有一副室，后翅5脉发达。

赭灰裴夜蛾 *Perynea ruficeps* (Walker) (图版XL-23)

Thermesia ruficeps Walker, 1864, J. Linn. Soc. Lond., Zool. 7: 186. (Sarawak)

Thermesia sparsa Walker, 1864, J. Linn. Soc. Lond., Zool. 7: 186. p. 187.

Corgatha castaneiceps Hampson, 1896, Fn. Br. Ind. 4: 519.

Sophta ruficeps: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 257, pl. 23k.

Corgatha ruficeps: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 294, pl. 157, fig. 8. —Draudt, 1935, in Seitz, Macrolep. World 3 Suppl. p. 206.

翅展 20 mm。头部与颈板红棕色，胸部淡赭灰色杂有深棕色，前足前缘及中足胫节带有红棕色，跗节暗褐色；前翅淡赭灰色，带有暗棕色并布有黑色细点，内线深棕色，大波浪形外弯，后半弱，肾纹黑色，由3个黑点组成，外线灰色，自前缘脉外弯至4脉前，折向内斜，外区前缘脉上有一列黄灰点间以暗褐纹，亚端线灰色，稍间断，衬以黑褐色，在亚中褶处稍内弯，翅外缘有一列黑点，缘毛暗棕色；后翅淡赭灰色带有暗棕色，横脉纹为一黑点，外线灰色，内侧衬以暗棕色，较直，亚端线灰色间断，翅外缘有一列黑点，缘毛暗棕色；腹部淡赭灰色杂有深棕色。

分布 四川；日本，斯里兰卡，马来西亚。

蝠夜蛾属 *Lophoruza* Hampson

Lophoruza Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 225.

Type-species: *Lophoruza vacillatrix* Hampson.

Eugnathia Warren, 1912, in Seitz, Macrolep. World 3: 271.

Lophograpta Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 411.

喙发达，下唇须向上伸，第二节达到或超出头顶，第三节长或中常，额平滑，复眼圆大，雄蛾触角有纤毛；胸部几全被鳞毛，无毛簇；腹部有一列小毛簇；前翅顶角较