

福衫夜蛾 *Phlogophora beatrix* Butler (图版XXXII-18)

Phlogophora beatrix Butler, 1878, Ann. Mag. nat. Hist. 5 (1): 193. (日本)

Chutapha beatrix: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 497. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 257.

Phlogophora beatrix: Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 759.

翅展 46—52mm。头部红褐色；胸部赭黄带红褐色；前翅红褐色，外区带灰白色，内线、外线均双线暗褐色，前者较直外斜，后半内方有近三角形褐斑，环纹、肾纹后端相连，两纹间暗褐色，内线、外线间区域的后半部约呈 V 形暗褐纹，亚端线黄白色锯齿形，两侧暗褐色，翅外缘一列黑褐纹；后翅赭黄，可见暗褐外线与亚端线，翅脉浅褐色；腹部红褐色。

分布 湖南、西藏；日本。

昌衫夜蛾 *Phlogophora beata* (Draudt) (图版XXXII-19)

Chutapha beata Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 105, pl. 7, fig. 12. (云南丽江)

翅展 35mm。头部赭黄带红褐色；胸部及前翅红褐色，前翅基线、内线及外线均双线黑褐色，内线后半内方暗褐并与后缘区近基部的黑褐斑相合，基线外的中室有粗黑点，环纹斜椭圆形，内、外缘黑色，外线后半锯齿形，内方在中室后黑棕色，中室大部黑棕色，亚端线赭黄色，内侧 3—7 脉间有一黑窄条；后翅赭黄带褐色，可见外线与亚端线；腹部红褐色。

分布 云南。

鼠褐衫夜蛾 *Phlogophora meticulodina* (Draudt) (图版XXXII-20)

Trigonophora meticulodina Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 104, pl. 7, fig. 11. (云南丽江)

Phlogophora meticulodina: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 264.

翅展 41mm。头、胸褐黄微带红色；前翅浅褐带红色，基线，内线均双线黑棕色，内线后部有一棕色三角形大斑，中区一 V 形黑棕纹，环纹浅褐黄色，前端超出中室，肾纹黑棕色，中有褐黄纹，两纹间黑棕色，外线双线黑棕色，亚端线浅黄色，内侧一粗黑线，外侧大部黑棕色；后翅黄白色，外线褐黑色，亚端线浅黄色，内侧衬暗褐色，外缘 2—4 脉间一黑褐纹；腹部黑灰色。

分布 云南、西藏。

黑缘衫夜蛾 *Phlogophora fuscomarginata* Leech (图版XXXII-21)

Phlogophora fuscomarginata Leech, 1900, Trans. ent. Soc. p. 72. (中国西部: Pu-tsu-fong)