

Trigonophora fuscomarginata: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 490, —Warren, 1911, in Seitz, Macrolep. World 3: 170.

Phlogophora fuscomarginata: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 263.

翅展 45—48mm。头、胸浅红棕色；前翅浅褐黄色带红棕色及紫色，基线双线黑褐色，内线双线黑色，外一线后端外伸与外线相遇，环纹及肾纹巨大，红棕色带黑色，边缘黄色及黑色，但前后端开放，一黑棕斜纹自肾纹中部外侧内斜并渐扩展，外线黑色，在 5 脉折成一巨角，然后极度内斜，在 4 脉后与黑棕斜纹相合，亚端线淡黄色，内侧有一黑粗线自 7 脉达头缘，外侧自 6 脉至后缘均黑灰色；后翅淡红褐色，外线、亚端线暗褐色，外缘一黑棕条；腹部褐色。

分布 四川、云南。

紫褐衫夜蛾 *Phlogophora subpurpurea* Leech (图版 XXXII-23)

Phlogophora subpurpurea Leech 1900, Trans. ent. Soc. p. 71. (四川康定)

Trigonophora subpurpurea: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 490.

Phlogophora subpurpurea: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 264.

翅展 53mm。头、胸褐色带紫灰色；前翅褐色带紫，基线棕色，内线双线，波曲外斜，外线双线棕色，外斜至 5 脉折角内斜，后端与内线相遇，两线后半段衬深棕色，在中脉后约呈“V”形，环纹褐色，椭圆形，肾纹棕红色，斜椭圆形，亚端线深棕色双线，端线黑色，后缘区基部及外缘区大部紫棕色，翅外缘微锯齿形；后翅微黄，大部带有赭色，2 脉褐黑色，外线褐色，折角于 4 脉，端线黑棕色；腹部褐灰色。

分布 甘肃、四川、云南、西藏；印度。

线衫夜蛾 *Phlogophora olivacea* (Leech) (图版 XXXII-22)

Euplexia olivacea Leech, 1900, Trans. ent. Soc. p. 85. (中国西部: Putsu-fong)

Chutapha olivacea: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 496. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 264.

翅展 40mm。头、胸及腹部褐灰色；前翅霉绿色，基部及外线至亚端线间微白，基线双线黑色，达到 1 脉，内线双线黑色，波浪形外斜，内一线弱，线间紫灰色，剑纹小，霉绿色，黑边，环纹及肾纹大部霉绿色，后方有一白斑与两纹相连，白斑前半中央霉绿色，后方有一黑云纹，外线双线黑色，锯齿形，线间紫灰色，外一线外侧衬一灰白线，亚端线暗黄色，两侧微黑，端线黑色，内侧较灰，外线至亚端线一段的前缘脉有四个白点，外线以内的 9—12 脉间灰色；后翅紫灰色带褐色。

分布 四川。