

正反面均可见弱小深色中点。

雄性外生殖器：同属征描述。

雌性外生殖器（图 267）：表皮突带状。肛瓣瘦长。囊导管与囊体等粗，上端弱骨化，中部一侧散布微刺。

检视标本：1♀，海南尖峰岭，1983. V. 6；1♀，云南屏边，1 500 m，1956. VI. 18。

分布：台湾、海南、云南；日本。

华丽妒尺蛾 *Phthonoloba decussata* (Moore, 1868)

Sauris decussata Moore, 1868, Proc. zool. Soc. Lond. 1867: 655, pl. 33: 10. (印度)

Phthonoloba decussata; Warren, 1894, Novit. zool. 1: 397.

Hypocometa decussata; Dugdale, 1980, Australian J. Zool. 28: 312.

分布：福建、台湾、四川；印度，锡金。

中国分布下述亚种。

台湾亚种 *subsp. moltrechti* Prout, 1958 (图版 V: 8)

Phthonoloba decussata moltrechti Prout, 1958, Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.) 6: 455. (台湾)

前翅长：♂♀16—17 mm。下唇须约 2/3 伸出额外，基半部绿色，第二节中部之外黑褐色。额、头顶和胸部背面翠绿色，有少量黑褐色；腹部背面灰黄色。前翅翠绿色，斑纹深灰褐至黑褐色；径副室两个；亚基线至外线共四条波状细带，带间散布少量灰褐色；中点小而圆，黑色；亚缘线浅色波状，其内侧有两条纤细波线，在前缘、M 脉之间和 Cu₂ 以下常扩展成深色斑块；亚缘线外侧在翅脉间有一列黑褐色点；缘线在翅脉端有一列黑褐点；缘毛浅黄绿与黑褐色相间。后翅和翅反面灰褐色；后翅正反面可见深色中点和模糊带状外线；前翅反面略带灰黄色，隐见正面斑纹。

雌性外生殖器（图 266）：表皮突细长。囊导管与囊体较前种细，微刺散布范围较大。

检视标本：1♀，福建武夷三港，1979. IX. 29；1♀，同前，1980. IX. 28；1♀，四川峨眉山，800—1 000 m，1957. IX. 20；1♂，云南腾冲黑泥塘，1 930 m，1992. V. 28—30。

分布：福建、台湾、四川。

暗绿妒尺蛾 *Phthonoloba olivacea* Warren, 1893

Phthonoloba olivacea Warren, 1893, Proc. zool. Soc. Lond. 1893: 363, pl. 31: 20. (印度：大