

Apamea sordens: Forster et Wohlfahrt, 1971, Schmett. Mitteleur. p. 130. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 253.

翅展 42mm。头、胸、腹及前、后翅均浅褐色，前翅中区较暗，亚中褶基部一黑纹，基线、外线均双线黑色波浪形，内线黑色，后半波浪形，剑纹小，环纹及肾纹微白，中线黑色，亚端线浅褐色，中段波浪形外弯。雄蛾抱钩强折曲，阴茎端部有锯齿(图 489)。

寄主 小麦、蒲公英属。

分布 黑龙江、内蒙古、甘肃、青海、新疆、四川、云南；日本，欧洲。

夕夜蛾属 *Plagideicta* Warren

Plagideicta Warren, 1914, Nov. zool. 21: 339.

Type-species: *Euplexia leprosticta* Hampson.

喙发达，下唇须斜向上伸，第二节达额中部，有致密鳞片，额有一平截椎形突起，其下有角质片，复眼大，圆形，雄蛾触角较扁，鳃片形，前、后胸有散开的毛簇，腹部基节背面有毛簇，前翅有副室。

种 检 索 表

- | | |
|--------------------|------------------------------------|
| 1. 前翅前缘区有一宽条 | 2 |
| 前翅前缘区有一组白斑 | 3 |
| 2. 前翅臀角有一白斑 | 夕夜蛾 <i>Plagideicta leprosticta</i> |
| 前翅臀角无白斑 | 斑夕夜蛾 <i>P. leprosa</i> |
| 3. 体小 | 仲夕夜蛾 <i>P. minor</i> |
| 体大 | 4 |
| 4. 抱器瓣背缘中部拱曲 | 联夕夜蛾 <i>P. major</i> |
| 抱器瓣背缘中部不拱曲 | 大班夕夜蛾 <i>P. magniplaga</i> |

夕夜蛾 *Plagideicta leprosticta* (Hampson)

Euplexia leprosticta Hampson, 1906, J. Bomb. nat. Hist. Soc. 17: 469. (斯里兰卡)

Plagideicta leprosticta: Warren, 1914, in Seitz, Macrolep. World 11: 339, pl. 30a.

翅展 32mm。头部黄褐色；胸部白色杂黑褐色；前翅褐色，基部一大白斑，中室端一白斑内斜至前缘脉，顶角一白斑连一大白斑，臀角一小白斑，中线黑色，外线双线黑色锯齿形，在翅脉上为小白点，亚端线锯齿形，内侧有隐约的浅褐斑；后翅浅褐色；腹部黄褐色。

分布 广东、云南；斯里兰卡，新加坡，印度尼西亚。