

**斑夕夜蛾 *Plagideicta leprosa* (Hampson) (图版XXXI-6)**

*Polydesma leprosa* Hampson, 1898, Bomb. Soc. 11: 455. (印度)

*Plagideicta leprosa*: Warren, 1914, in Seitz, Macrolep. World 11: 340. ——Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 38.

翅展 31mm。头部赭黄杂深褐色；胸部白色杂暗灰色；前翅红褐带黑色，基部一大斜方形白斑，基线仅前端现一黑纹，内线黑色，前段外侧有白点，环纹、肾纹白色，后者大，8字形，前半外方有一列白斑连成片伸至顶角，外线黑色，后半锯齿形，亚端线暗褐色；后翅黄白带污褐色；腹部黄褐色。

**分布** 四川；印度。

**大斑夕夜蛾 *Plagideicta magniplaga* (Walker) (图版XXXI-7)**

*Thyatira magniplaga* Walker, 1858, List Spec. Ins. Colln Br. Mus. 15: 1643. (沙捞越)

*Plagideicta magniplaga*: Holloway, 1982, in Barlow, Moths S. E. Asia, p. 230.

*Mudaria magniplaga*: Holloway, 1989, Malay. Nat. J. 42: 190. pl. 6, figs. 3, 4.

翅展 34—40mm。头部深棕色，下唇须第二、三节端部褐灰色；胸部背面深棕色，颈板端半部色较浅，翅基片除前内角外均黄白色，足外侧黑棕色，跗节各节间有白斑；前翅暗褐色，基部有一大白斑，其前缘二曲，外缘拱曲，中区有一大白斑，位于前缘脉与中室后缘间，约呈三瓣形，近顶角有一大白斑，近圆形，其外侧另有一小白斑达顶角，其后有一列小白斑组成亚端线，但极不明显，仅 1—2 脉间的一小白斑较大而显，翅外缘有一列新月形黑点；后翅褐色，缘毛浅赭黄色，中有一褐线；腹部褐色。

**分布** 海南；马来西亚。

本种斑纹似波纹蛾，故曾置波纹蛾科，但前翅翅脉属四叉型，与波纹蛾科脉相不同。

**仲夕夜蛾 *Plagideicta minor* Holloway (图版XXXI-8)**

*Plagideicta minor* Holloway, 1982, in Barlow, Moths S. E. Asia, p. 86, pl. 28. fig. 6. (马来西亚)

翅展 30—32mm。头部黑褐色，头顶杂有褐灰色，下唇须第二、三节端部褐灰色；胸部背面黑褐色杂褐色，颈板内半部浅褐色，翅基片白色，前缘内侧黑褐色，前胸有白斑，中胸有白色鳞，下胸浅褐色，足外侧黑褐色，胫节有白纹，各跗节间有白斑；前翅褐色，部分带黑褐色，翅基部有一大白斑，其外缘拱曲，达内线，内中区有一长斜白斑，自前缘脉至中室下角，似由三个白圆斑拼接而成，亚端区有一大白斑，自前缘脉至 6 脉，约呈圆形，其外侧另有一小白斑，位于顶角，其前外端伸达缘毛，基线双线黑褐