

Platyja ciacula: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 540.

翅展 50—60 mm。头部与胸部深棕色，布有零星细白点，下唇须第三节内侧有白纹，足跗节各节间有白斑；前翅深棕色，布有零星蓝灰细点，外区及其外方蓝灰点致密，成雾状，基线前半白色，后半褐色，自前缘脉波曲外弯至亚中褶，内线红褐色，较直半斜，在前缘区为白色，在 1 脉后斜度较大，环纹大，黑棕色，红棕色边，卵圆形，肾纹大，与环纹同色，外线黑褐色，外侧衬白色及褐色，自前缘脉微曲外斜至 6 脉，强折角内斜，3 脉后微外斜至亚中褶回弯向上达肾纹后，沿中室后缘稍内伸，折角微波曲外斜，后端近达臀角，回弯处似一瓶状，中有二浅灰黄斑，外线与肾纹间有三个黑棕点，均围以白边，或带褐色，外线折角前的外方有一近三角形黑棕色大斑，其外端达顶角，外缘衬白色，中脉及外线外方的各翅脉纹黑棕色，在三角斑内不明显；后翅深棕色，外半布有蓝灰细点，外线外方在 6 脉之后蓝灰点致密，成雾状，外线黑棕色，外侧衬白色，微波曲，6 脉前及 1 脉后不显，线外方的各翅脉有黑棕纹，缘毛黑棕色，端部有少许蓝灰色；腹部暗棕色。

分布 广西；印度。

端带宽夜蛾 *Platyja crenulata* Holloway (图版 LXI-11)

Platyja crenulata Holloway, 1976, Moths Borneo p. 34, pl. 14, fig. 167. (Borneo)

翅展 60 mm。头部与胸部褐色，足跗节各节间有白斑；前翅红褐色，布有零星细白点，基线仅在前缘脉及亚中褶各现一白点，内线仅在前缘脉现一白点，在中室前后缘及 1 脉各现一白纹，环纹只现一白点，肾纹内侧中央一白点，外侧由小白点纹组成双曲线，2 脉基部后方有一波曲黑褐线，其内侧有一黄纹，外线黑褐色，深波浪形，自前缘脉外弯，在 2—3 脉间成一环，环内浅黄色，外线前半内侧带赭黄色，成一短带状，外线外侧有一列不整齐白点，端区有一黑褐窄带，并沿各翅脉向内渗化近达外线，带的外半有一波曲较粗白线，带的外侧与翅外缘间另一白线，缘毛基半部亦带白色，顶角稍尖，翅外缘直；后翅暗红褐色，端区色微黑，近翅外缘有一蓝白粗线，但不达顶角，端线白色，缘毛基半部带白色，翅外缘直，臀角较尖，翅后缘端部斜削；腹部暗褐色。

分布 广西；加里曼丹。

宽夜蛾 *Platyja umminia* (Cramer) (图版 LXI-13)

Phalaena Noctua umminia Cramer, 1780, Uitl. Kapell. 2: 137, pl. 167, F. (爪哇)

Ophisma trajecta Walker, 1869, Char. Undescr. Lep. Het. p. 108.

Hulodes falcata Felder et Rogenhofer, 1874, Reis. Nov. pl. 115, fig. 8.

Platyja umminia: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 593. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 379. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 368. —Barlow, 1982,

Moths SE Asia, p. 104.

翅展 46 mm。全体棕赭色；前翅内线黑棕色波浪形外弯，环纹为一黑点，肾纹棕色黑边，外缘中凹，外线黑棕色锯齿形，在 2 脉处回升至肾纹后再折向后行，顶角一黑棕内斜线，雄蛾亚中褶一棕色环，雌蛾则为二红棕斑，中央白色；后翅外线黑棕色锯齿形，亚端线不明显。

寄主 稻、杂草。

分布 湖南、福建、广东、海南、云南；印度尼西亚。

妖夜蛾属 *Iontha* Doubleday

Iontha Doubleday, 1842, Entomologist 1: 297.

Type-species: *Iontha umbrina* Doubleday.

喙发达，下唇须向上伸，第二节紧贴前额，约达头顶，第三节短，无毛，雄蛾触角锯齿形，胸部被平滑鳞片；腹部极长，臀毛簇发达，散开呈扇形，后足胫节及第一跗节外侧饰长毛；前翅前缘外半拱曲，翅后缘弧形，顶角尖，外缘前半微锯齿形，后半强内斜；后翅顶角强外突成齿，臀角强外突，外缘中凹明显，8 脉外半弯曲。

妖夜蛾 *Iontha umbrina* Doubleday (图版 LXI-14)

Iontha umbrina Doubleday, 1842, Entom. 1: 298. (Bengal)

Platyja rufiscripta Swinhœ, 1904, Trans. ent. Soc. p. 141.

Iontha umbrina: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 541. —Barlow, 1982, Moths SE Asia p. 104, pl. 34, fig. 5.

翅展 51 mm。头部黑褐色，下唇须第三节有小灰斑；胸部背面暗棕色带灰色，下胸黑褐色，有二交叉白色条纹，前足腿节与胫节外侧有较长黑褐毛，内侧大部白色，中足与后足胫节外侧褐色，前足与中足跗节灰色带褐色，各节间有灰白斑，后足跗节饰暗褐毛；前翅暗棕色，隐约可见内线，环纹仅现一黑褐点，肾纹深褐色，不明显，边缘微带灰白色，中线深褐色，仅在中室后可见波浪形达翅后缘，外区在 5 脉前有一模糊黄褐斑，自亚前缘后外斜，翅外缘有一灰白色带，其中可见黑褐色波浪形端线，缘毛暗褐色，基部与端部灰白色，翅外缘极斜，臀角圆钝，翅后缘基半部饰较长毛；后翅深褐色，外区有一列灰白点，端区带有紫白色，但达顶角，其中有一列新月形深褐点，翅外缘直，顶角强外突，臀角前有一钝齿形突，此二突的外缘毛暗棕色，其余灰白色杂褐色；腹部背面暗褐色，腹面黄白色，臀毛簇黑色。

分布 海南；孟加拉国，印度，马来西亚，印度尼西亚。

描述据雄蛾，手头无雌蛾标本。