

缘，两侧衬白色，中室端部有一小褐斑，前缘区近顶角有一褐斑，内、外侧衬白色，外缘稍凹；后翅灰白色微带褐色；腹部白色带褐色。

**分布** 四川；日本，印度，斯里兰卡。

## 朴夜蛾属 *Plusilla* Staudinger

*Plusilla* Staudinger, 1892, in Rom., Mem. Lep. 6: 533.

Type-species: *Plusilla rosalia* Staudinger.

喙退化，身体小，下唇须向上伸，第二节细长，达到头顶，额平滑，复眼圆大，雄蛾触角微呈齿形，有纤毛；胸部几全是鳞片，无毛簇，胫节有毛；腹部只基节上有毛簇；前翅顶角圆，外缘不呈波浪形。

### 朴夜蛾 *Plusilla rosalia* Staudinger (图版XXXIII-29)

*Plusilla rosalia* Staudinger, 1892, Mem. Lep. 6: 533, pl. 9, fig. 11. (黑龙江地区)

*Plusilla rosalia*: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 590. ——Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 784. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 268.

翅展 28—30 mm。头、胸褐色带粉红色；前翅黄褐带粉红色，中线、外线间带暗红棕色，内线不显，中线黑棕色，内侧衬黄白色，外线粗，白色，后半两侧衬黑色；后翅黄白微褐，中室外、后方有细褐点，外线褐色波曲；腹部灰褐色。

**分布** 黑龙江、江苏、湖北；俄罗斯。

## 遗夜蛾属 *Fagitana* Walker

*Fagitana* Walker, 1865, List Spec. Ins. Colln Br. Mus. 32: 645.

Type-species *Fagitana lucidata* Walker.

*Pseudolimacodes* Grote, 1874, Can. ent. 6: 212.

喙发达，下唇须向上伸，第二节达头顶，第三节较长，额光滑无突起，复眼大，圆形，雄蛾触角锯齿形；胸部被毛和毛状鳞，无毛簇；腹部基部几节背面有毛簇；前翅有一副室；后翅 5 脉微弱，自中室横脉中下部发出。

### 宏遗夜蛾 *Fagitana gigantea* Draudt (图版XXXIII-30)

*Fagitana gigantea* Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 109, pl. 7, fig. 26. (云南丽江)

*Fagitana gigantea*: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 268.

翅展 49 mm。头、胸及前翅黄褐杂黑色，前翅除 1 脉、径脉主干及亚前缘脉外，各