

翅展 25 mm。头、胸黄褐色；前翅浅褐色，内区、亚端区有金色大斑，基线双线黑色，内侧衬白色，内线三线波浪形，内一线棕色，其余紫黑色，肾纹灰色有褐和金色边缘，中线褐色，后半内斜，外线双线，内一线紫黑，外一线棕色，在 7 脉折角，亚端区有二金色大斑，前者长弯，中央灰色，后一斑中有褐线，顶角有蓝白纹，端线前半蓝白及黑色，内侧有一双齿形黑纹；后翅浅褐色；腹部灰黄色。

寄主 蝙蝠葛。

分布 黑龙江、山东、江苏、浙江、湖北、湖南、福建；日本，朝鲜。

肖金夜蛾 *Plusiodonta coelonota* (Kollar) (图版 LXIII-6)

Plusia coelonota Kollar, 1844, Hugel's Kashmir p.482. (印度)

Plusiodonta chalsytoides Guenée, 1852, Hist. nat. Ins., Noct. 2: 360.

Deva coelonota: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 384.

Plusiodonta coelonota: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 577. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 372.

翅展 30 mm。头、胸褐黄杂白色；前翅金色带褐色，内线双线深棕色，肾纹新月形，黄色褐边，外线双线，内一线黑色，外一线褐色，均自前缘脉外斜至 7 脉折成一尖角内斜并微波曲，前后端均衬以白色，亚端区有一不规则形长条，边缘褐色，其后另有一不规则形斑，亦有褐边，顶角有一白纹，其后有一黑棕色纹，端线由一系列白色曲纹组成；后翅暗褐灰色，缘毛白色；腹部暗褐灰色。

分布 福建、华东；印度，斯里兰卡，缅甸，印度尼西亚。

褐肖金夜蛾 *Plusiodonta auripicta* Moore (图版 LXIII-7)

Plusiodonta auripicta Moore, 1882, Lep. Atk. p. 150. (大吉岭)

Plusiodonta accripicta: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 578. as a syn. of *coelonota*.

Deva auripicta: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 384, pl. 70a.

翅展 31 mm。头部与颈板浅褐黄色，头顶有暗褐色毛簇，触角基节有白斑，下唇须外侧大部暗棕色，颈板基部与端部杂暗棕色；胸部背面灰褐色，足外侧暗棕色；前翅红棕色，布有蓝灰色、棕色及黑褐色细点，部分带金色，前缘区近基部有一金斑，内线隐约可见黑褐色，不规则波曲外弯，在亚中褶后为双线，后端的双线间及内外侧金色，环纹不明显，肾纹有微弱蓝白色边线，中线粗而模糊，红棕色，较直内斜，外线不清晰，隐约可见双线黑色，自前缘脉外斜至 4 脉，折角内斜，在亚中褶后的线外侧衬蓝灰色，亚端线双线黑色不规则波曲，自顶角至 3 脉，两线相距较宽，线间金色带褐色，2 脉后有一浅黄斑达臀角，有细黑边，臀角区带有金色，亚端线与外线间在 6 脉前大部黑褐色杂蓝灰色，端区有一列黑褐纵纹，翅外缘有一银白色波浪形线，端区中部有一银白

斜纹，缘毛黑褐色杂浅褐色；后翅暗褐色，端线黑褐色。

分布 广西；印度。

胡夜蛾属 *Calesia* Guenée

Calesia Guenée, 1852, in Boisduval et Guenée, Hist. nat. Ins., Noct. 3: 257.

Type-species: *Calesia comosa* Guenée.

Pasipeda Walker, 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 15: 1794.

Mecyra Walker, 1865, List. Spec. Lep. Colln Br. Mus. 33: 979.

Zirona Walker, 1869, Pro. nat. Hist. Soc. Glasgow, 1: 363.

Asymbata Gerstaecker, 1871, Arch. Naturg. 37 (1): 360.

下喙须向上伸，鳞片平滑，第二节达头顶，第三节长而光滑无鳞，雄蛾触角节间有鬃毛；胸部、腹部及足鳞片平滑；雄蛾前翅中室外前方有一大丛毛，胡须状，无副室；后翅中室很短。幼虫第一及第二对腹退化。

种 检 索 表

1. 前翅中室及亚端区有白斑 伴秃胡夜蛾 *Calesia stillifera*
- 前翅中室及亚端区无白斑 2
2. 雄蛾前翅前缘区有毛簇 胡夜蛾 *C. dasypterus*
- 雄蛾前翅前缘区无毛簇 红腹秃胡夜蛾 *C. haemorrhoea*

伴秃胡夜蛾 *Calesia stillifera* Felder et Rogenhofer (图版 LXIII-8)

Calesia stillifera Felder et Rogenhofer, 1874, Reis. Nov. pl. 117, fig. 18. (马尼拉)

Pasipeda satellitia Moore, 1884—1887, Lep. Ceyl. 3: 184.

Calesia satellitia: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 580.

Pasipeda satellitia: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 372.

Calesia stillifera: Poole, 1989, Lep. Cat., Noct. p. 185.

翅展 39 mm。头部暗黄色，触角基节暗黄色，其余黑色，下唇须第三节细长，超过头顶，黑色；胸部背面褐灰色，颈板基部暗黄色，端半部褐灰色，足胫节黄色，外侧端部有一黑斑，跗节外侧黑色，各节间有浅黄色斑；前翅褐色带灰色，中室端部有一白色圆斑，其前内方有一小白圆点，亚端区有一列白色圆形或扁圆形斑，排成波曲形；后翅褐色带灰色，基部色较浅；腹部背面红色，基节灰色。

分布 广东、海南；印度，斯里兰卡，菲律宾。

胡夜蛾 *Calesia dasypterus* (Kollar) (图版 LXIII-9)

Erebus dasypterus Kollar, 1844, Hugel's Kashmir p.476. (Himalaya)