

翅展 25 mm。头、胸黄褐色；前翅浅褐色，内区、亚端区有金色大斑，基线双线黑色，内侧衬白色，内线三线波浪形，内一线棕色，其余紫黑色，肾纹灰色有褐和金色边缘，中线褐色，后半内斜，外线双线，内一线紫黑，外一线棕色，在 7 脉折角，亚端区有二金色大斑，前者长弯，中央灰色，后一斑中有褐线，顶角有蓝白纹，端线前半蓝白及黑色，内侧有一双齿形黑纹；后翅浅褐色；腹部灰黄色。

寄主 蝙蝠葛。

分布 黑龙江、山东、江苏、浙江、湖北、湖南、福建；日本，朝鲜。

肖金夜蛾 *Plusiodonta coelonota* (Kollar) (图版 LXIII-6)

Plusia coelonota Kollar, 1844, Hugel's Kashmir p. 482. (印度)

Plusiodonta chalsyoides Guenée, 1852, Hist. nat. Ins., Noct. 2: 360.

Deva coelonota: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 384.

Plusiodonta coelonota: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 577. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 372.

翅展 30 mm。头、胸褐黄杂白色；前翅金色带褐色，内线双线深棕色，肾纹新月形，黄色褐边，外线双线，内一线黑色，外一线褐色，均自前缘脉外斜至 7 脉折成一角内斜并微波曲，前端均衬以白色，亚端区有一不规则形长条，边缘褐色，其后另有一不规则形斑，亦有褐边，顶角有一白纹，其后有一黑棕色纹，端线由一列白色曲纹组成；后翅暗褐灰色，缘毛白色；腹部暗褐灰色。

分布 福建、华东；印度，斯里兰卡，缅甸，印度尼西亚。

褐肖金夜蛾 *Plusiodonta auripicta* Moore (图版 LXIII-7)

Plusiodonta auripicta Moore, 1882, Lep. Atk. p. 150. (大吉岭)

Plusiodonta accripicta: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 578. as a syn. of *coelonota*.

Deva auripicta: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 384, pl. 70a.

翅展 31 mm。头部与颈板浅褐黄色，头顶有暗褐色毛簇，触角基节有白斑，下唇须外侧大部暗棕色，颈板基部与端部杂暗棕色；胸部背面灰褐色，足外侧暗棕色；前翅红棕色，布有蓝灰色、棕色及黑褐色细点，部分带金色，前缘区近基部有一金斑，内线隐约可见黑褐色，不规则波曲外弯，在亚中褶后为双线，后端的双线间及内外侧金色，环纹不明显，肾纹有微弱蓝白色边线，中线粗而模糊，红棕色，较直内斜，外线不清晰，隐约可见双线黑色，自前缘脉外斜至 4 脉，折角内斜，在亚中褶后的线外侧衬蓝灰色，亚端线双线黑色不规则波曲，自顶角至 3 脉，两线相距较宽，线间金色带褐色，2 脉后有一浅黄斑达臀角，有细黑边，臀角区带有金色，亚端线与外线间在 6 脉前大部黑褐色杂蓝灰色，端区有一列黑褐纵纹，翅外缘有一银白色波浪形线，端区中部有一银白