

Polia suavis: Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 131. —Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 81.

翅展 35mm。头、胸灰色杂褐色；前翅浅紫褐色，基线、内线及外线均双线黑色，基线、内线波浪形，外线锯齿形，剑纹、环纹、肾纹均大，剑纹暗褐色，环、肾纹浅紫红色，后者前、后端稍内突，中线模糊暗褐色，亚端线白色，内侧一列新月形黑纹；后翅黄白带褐色，翅脉纹色暗；腹部灰褐色。

分布 黑龙江、青海、河北；俄罗斯。

中黑灰夜蛾 *Polia fasciata* (Leech) (图版 XVIII-5)

Hecatera fasciata Leech, 1889, Trans. ent. Soc. Lond. p. 134, pl. 9, fig. 8. (江西九江)

Polia fasciata: Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 189. —Warren, 1909, in Seitz, Macrolep. World, 3: 75. —Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 33. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 300. —Chen, 1992, in Peng. Icon. For. Ins. Hunan p.963.

翅展 30mm。头部与胸部灰色杂有黑棕色；前翅灰白色，布有黑色细点，内线与外线之间黑点最致密，使中区近呈黑色，基线黑褐色，仅在前缘脉及中室后可见，内线白色，波浪形外斜，环纹与肾纹不显，外线白色，不规则波浪形，自前缘脉后外弯，在中褶处内弯，4脉后内斜，亚端线白色，曲度与外线相似，外侧黑灰色，端线由一列黑点组成，缘毛端部黑白相间；后翅淡褐色，基部色浅；腹部灰褐色。

分布 浙江、湖南、江西、四川。

杂灰夜蛾 *Polia mista* (Staudinger) (图版 XVIII-6)

Mamestra mista Staudinger, 1889, Stett. ent. Z. p. 35. (伊塞库尔)

Polia mista: Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 147, pl. 82, fig. 8. —Warren, 1910, in Seitz, Macrolep. World 3: 74, pl. 17e. —Chen, 1982, Icon. Het. sin. 3: 300, pl. 90, fig. 2135.

翅展 31mm 左右。头部及胸部白色杂褐色，额有黑条，下唇须外侧微黑，翅基片外缘有黑纹；前翅灰色带金褐色，肾纹周围及端区金褐色更浓，基线双线黑色达中室，亚中褶基部有一黑纵纹，内线双线黑色，波浪形外斜，剑纹大，黑灰色，黑边，环纹、肾纹灰色黑边，中有褐纹，中线褐灰色，后半弱，外线黑色锯齿形，前端为双黑点，外侧衬白色，亚端线白色，在 3、4 脉上外突成齿形，内侧有几个黑斑，尤其 4—6 脉间明显成齿形，端线为一列黑点；后翅污白色带褐色。

分布 新疆；中亚地区。

红棕灰夜蛾 *Polia illoba* (Butler) (图版 XVIII-7)

Agrotis illoba Butler, 1878, Ann. Mag. nat. Hist. (5) 1: 162. (日本)