

分布 四川、云南。

冥灰夜蛾 *Polia mortua* (Staudinger) (图版 XVII-30)

Mamestra mortua Staudinger, 1888, Stett. ent. Z. p. 249. (阿斯科尔德)

Mamestra nigerrima Warren, 1888, Proc. zool. Soc. p. 302.

Hadena kala Swinhoe, 1900, Cat. Het. Mus. Oxon 2: 17.

Polia mortua: Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 104. —Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 702. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 298.

翅展 42mm。头、胸及前翅黑棕色，后者微带紫色，布有细黑点，基线、内线及外线均双线黑色，基、内线波浪形，外线锯齿形，剑纹，环纹、肾纹均色暗，后者外侧后端有二白点，前端一白点，亚端线灰白，内侧一列黑点；后翅黄白，端区带褐色；腹部褐色。

分布 黑龙江、内蒙古、甘肃、四川、贵州、云南、西藏；锡金，印度，俄罗斯。

冷灰夜蛾 *Polia ferrisparsa* (Hampson) (图版 XVII-31)

Hadena ferrisparsa Hampson, 1895, Fn. Br. Ind. 2: 201. (印度)

Polia ferrisparsa: Warren, 1912, in Seitz, Macrolep. World 11: 71. —Chen et al., 1991, Noct. Fn. Xizang p.176.

翅展 38mm。头部褐色杂灰白色；胸部及前翅灰褐杂灰白或白色，后者部分带黑褐色，亚前缘脉有一褐灰纵纹伸达外区，基线、内线均双线黑色，剑纹端缘黑色，环纹小，外围灰白及黑色，肾纹窄，外线黑色锯齿形，齿尖为黑、白点，亚端线灰白，内侧衬黑色，在 7 脉折成外突角；后翅灰褐色，基部色浅；腹部灰白色。

分布 四川、云南、西藏；印度，克什米尔地区。

淡缘灰夜蛾 *Polia costirufa* Draudt (图版 XVII-32)

Polia costirufa Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 28, pl. 2, fig. 9. (四川巴塘)

Polia costirufa: Chen, 1982, Icon. Het. sin. 3: 301, pl. 90, fig. 2141. —Chen et al., 1991, Noct. Fn. Xizang p.178.

翅展 45mm 左右。头部及胸部深褐色；前翅褐色微带红棕色，前缘区在外线以内微白，基线两侧黑色，内线较直外斜，环纹圆形，淡褐色，肾纹微白，内半有一褐曲纹，外线细锯齿形外弯，内侧一列齿形黑斑，亚端线细锯齿形，中段内侧一列尖齿形黑斑，端线为一列新月形黑点；后翅淡褐色，缘毛微白；腹部褐色。

分布 黑龙江、内蒙古、新疆、山西，青海、山东、四川；蒙古，土耳其，欧洲，阿尔及利亚。