

色，缘毛黑白相间；后翅白色带黑褐色，横脉纹灰黑色，外线灰黑色，微波曲，亚端线在端区的黑灰色中显白色；腹部褐黑色。

分布 甘肃、云南。

绿灰夜蛾 *Polia scotochlora* Kollar (图版 XVIII-1)

Polia scotochlora Kollar, 1844, Hugel's Kashmir 4: 482. (印度)

Polia scotochlora: Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 116. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 299.

翅展 49mm。头、胸黑色杂灰白；前翅灰白杂黑色，大部带暗霉绿色，并布有细黑点，基线、内线及外线均双线黑色，内线波浪形，外线锯齿形，线间白色，剑纹黑边，环纹大而斜，约近方形，肾纹大，两纹均白色带暗灰，亚端线白色锯齿形，在 3、4 脉处强锯齿形，齿尖达翅外缘；后翅白色，外线黑褐色，翅脉及端区微黑；腹部褐灰色。

分布 四川、云南、西藏；印度。

阴灰夜蛾 *Polia satanella* (Alpheraky) (图版 XVIII-2)

Mamestra satanella Alpheraky, 1892, Hor. Soc. ent. Mosc. 26: 445. (Amdo 地区, Guj-Guj)

Polia satanella: Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 138. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 300.

翅展 30mm。头、胸暗褐杂灰色；前翅污灰褐色，内半带有黑褐色，基线、内线均双线黑色，剑纹、环纹小，肾纹大，中凹，中线模糊黑色，外线黑色锯齿形，亚端线黄白色，外侧衬暗褐色，在 3、4 脉处锯齿形，前端内侧一黑褐纹，端区暗褐色，但顶角浅褐黄色；后翅污褐色；腹部暗褐色。

分布 青海、西藏。

交灰夜蛾 *Polia praedita* (Hübner) (图版 XVIII-3)

Noctua praedita Hübner, [1813], Eur. Schmett., Noct. pl. 130, fig. 494. (欧洲)

Polia praedita: Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 126. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 299.

翅展 30mm。头、胸浅褐灰色；前翅灰色，大部带霉绿褐色，端区暗褐色，亚中褶基部一黑纵线，内线白色，外侧一黑细线，环纹白色斜方形，后方连一白斜纹，肾纹大，白色，后端与环纹相遇，外线白色，内侧衬黑，3、4 脉基部白色，亚端线白色，在 3、4 脉处成外突齿；后翅污白色，端区微褐；腹部黄灰色。

分布 内蒙古、新疆；欧洲。

紫褐灰夜蛾 *Polia suavis* (Staudinger) (图版 XVIII-4)

Mamestra suavis Staudinger, 1892, Mem. Lep. 6: 428, pl. 7, fig. 4. (西伯利亚)