

Remigea triangulata Walker, 1865, List Spec, Lep. Colln Br. Mus. 33: 1018.

Polydesma costimacula: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 468.

翅展 42—45 mm。头顶与颈板黑色，额褐色，下唇须外侧暗褐色；胸部淡黄褐色，足胫节外侧褐色，前足胫节端部杂褐黑色，各足跗节外侧黑色，各节间有黄白斑；前翅浅黄褐色，内线、外线及亚端线在前缘区均为一黑斑，其后极微弱，波浪形，肾纹前半为一黑线，后半为一近方形黑斑，亚端区在中褶与亚中褶有模糊暗褐斑，翅外缘有一列黑点；后翅浅黄褐色，隐约可见褐色外线，顶角有一黑褐斑，向后渐窄并内斜至亚端区；腹部浅黄褐色，背面微带黑褐色。

分布 海南、云南；锡金，印度，印度尼西亚。

纷夜蛾属 *Polydesma* Boisduval

Polydesma Boisduval, 1833, Nouv. Ann. Mus. Hist. nat. Paris 2: 256.

Type-species: *Polydesma umbricola* Boisduval.

Anthoemoisia Blanchard, 1840, Hist. nat. Anim. 3: 521.

Anthemoessa Agassiz, [1847] 1846, Nom. zool. Index Univ. p. 25.

Anodapha Moore, [1885] 1887, Lep. Ceyl. 3: 91.

Trichopolydesma Berio, 1954, Doriana 1 (5-): 6.

喙发达，下唇须向上伸，第二节达头顶，被鳞片，第三节短，雄蛾触角线形；胸部被平滑鳞片；腹部基节背面有微弱的毛簇；前翅较宽；雄蛾后翅反面有丝状长毛。

种 检 索 表

后翅反面的端带宽 曲线纷夜蛾 *Polydesma boarmoides*
 后翅反面的端带窄 暗纹纷夜蛾 *P. scriptilis*

曲线纷夜蛾 *Polydesma boarmoides* Guenée (图版 LIX-12)

Polydesma boarmoides Guenée, 1852, in Boisduval et Guenée, Hist. nat. Ins. Noct. 2:441. (爪哇)

Polydesma mastrucata Felder et Rogenhofer, 1874, Reis. Nov. pl. 111, fig. 31.

Polydesma boarmoides: Holloway, 1979, Lep. New Caled. p. 515.

翅展 50 mm。头部灰色；胸部褐色；前翅浅褐黄色，基线、内线及中线均只前段为一小黑斑，其后不明显，环纹隐约可见，肾纹模糊黑褐色，外线黑色锯齿形，前端为一黑斑，4脉后内斜并渐弱，亚端线不规则锯齿形，内侧暗褐色，近翅外缘一列黑纹；后翅浅褐色，中线粗，黑褐色，在中褶折角，外线双线黑色锯齿形，亚端线浅黄色，锯齿形，内侧黑褐色，近翅外缘一列黑纹；腹部浅褐灰色。

寄主 合欢属。

分布 云南；日本，印度，印度尼西亚，萨摩亚群岛，夏威夷，新喀里多尼亚。

暗纹纷夜蛾 *Polydesma scriptilis* Guenée (图版 LIX-13)

Polydesma scriptilis Guenée, 1852, in Boisduval et Guenée, Hist. nat. Ins. Noct. 2: 442, pl. 15, fig. 4. (East Indies: Silhet)

Polydesma otiosa Guenée, 1852, in Boisduval et Guenée, Hist. nat. Ins. Noct. 2: 442.

Polydesma scriptilis: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 367.

翅展 40 mm。全体灰褐色；前翅密布细黑点，基线、内线、中线及外线黑色，基线、中线及外线波浪形，内线、亚端线锯齿形，后者双线暗褐色，环纹为小黑环，肾纹有二黑点，亚端线外一线前段似斑条；后翅密布细黑点，各横线黑色波浪形，外线与亚端线均双线，翅外缘一列黑点。

分布 江西、海南、广西、贵州、云南；印度，孟加拉国。

蟠夜蛾属 *Pandesma* Guenée

Pandesma Guenée, 1852, in Boisduval et Guenée, Hist. nat. Ins., Noct. 2: 438.

Type-species: *Pandesma quenavadi* Guenée.

Thria Walker, 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 13: 1079.

Certia Walker, 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 14: 1343.

Michera Walker, 1865, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 33: 810.

Vapara Moore, 1882, Descr. new Indian Lep. Ins. Colln late Atk. p. 163.

Subpandesma Berio, 1966, Boll. Soc. ent. ital. 96: 140.

喙发达，下唇须向上伸，第二节达头顶；胸部被平滑鳞片；腹部基节有毛簇；前翅顶角稍尖；雄蛾后翅反面的基部有平滑鳞片。

蟠夜蛾 *Pandesma quenavadi* Guenée (图版 LIX-14)

Pandesma quenavadi Guenée, 1852, in Boisduval et Guenée, Hist. nat. Ins. Noct. 2: 438, pl. 15, fig. 3. (Bengal)

Pandesma quenavadi: Moore, 1884—1887, Lep. Ceyl. 3: 91. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 367. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 365—Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 869.

翅展 49 mm。全体灰色；前翅密布细黑点，基线，内线及外线黑色，内线与外线前段锯齿形，中线黑褐色，前段云状向内扩展，其后波浪形，肾纹小，近长方形，亚端线灰白色锯齿形内斜，内侧一褐带，前宽后窄，线外侧大部带褐色，端线波浪形，黑色间断，内侧一列黑点；后翅白色，翅脉有黑点，后缘区带褐色，亚端区至翅外缘有一褐