

(图 965: f), 翅脉与指名亚属大致相同, 但前翅较宽阔, 顶角截短, 形状十分奇特; 外缘浅波曲, 并在 Cu_1 处微凸, 前缘基部隆起。后翅后缘窄缩, 平直并延长, 臀角凸出。前翅 R_1 和 R_2 向上翘, 中室特别短小, 后翅无 3A。两亚属后翅外缘均锯齿状, 在 M_1 和 Cu_1 处的凸齿较大。

分布: 中国; 印度, 锡金, 斯里兰卡。

亚属检索表

1. 前翅顶角正常 亚属 *Polynesia*
 前翅顶角缺如 亚属 *Placotome*

亚属 *Polynesia* Swinhoe, 1892

菩尺蛾 *Polynesia sunandava* (Walker, 1861)

Pomasia sunandava Walker, 1861, List Specimens lepid. Insects Colln Br. Mus. 22: 657. (斯里兰卡)

Polynesia sunandava: Swinhoe, 1892, Trans. ent. Soc. Lond. 1892: 4.

鲜黄色。头部有深褐色斑。翅基部深褐色散布银色鳞片; 斑纹几乎完全同下种(切角菩尺蛾), 但各斑点颜色均较浅, 前翅前缘的斑块略扩大。

未见标本。

分布: 海南; 印度, 锡金, 斯里兰卡。

亚属 *Placotome* Warren, 1894

Placotome Warren, 1894, Novit. zool. 1: 395.

模式种: *Polynesia truncapex* Swinhoe, 1892 (印度: 卡西丘陵)

切角菩尺蛾 *Polynesia truncapex* Swinhoe, 1892 (图版 XXI: 12)

Polynesia truncapex Swinhoe, 1892, Trans. ent. Soc. Lond. 1892: 5. (印度: 卡西丘陵)

Placotome truncapex: Warren, 1894, Novit. zool. 1: 395.

Polynesia (Placotome) truncapex: Hampson, 1895, Fauna Br. India (Moths) 3: 418.

前翅长: ♂ 12—14 mm。下唇须深灰褐色, 基部白色, 掺杂少量桔红色, 端部色稍浅。额中部和头顶前半部黄白色, 额上下缘和头顶后半部桔红色。胸腹部背面大部浅黄色, 领片深灰褐色, 肩片中部有一深灰褐色点, 胸部和第一腹节有深灰褐色斑, 上述深灰褐色斑点周围均有少量桔红色。翅浅黄色, 前翅前缘色较深, 排布大小不均的深灰褐