

## 种 检 索 表

- 后翅黄色，亚中褶基部有黑条 ..... 雾裙剑夜蛾 *Polyphaenis oberthuri*  
 后翅褐黄色，亚中褶基部无黑条 ..... 绿影裙剑夜蛾 *P. subviridis*

**雾裙剑夜蛾 *Polyphaenis oberthuri* Staudinger (图版XXXIV-3)**

*Polyphaenis oberthuri* Staudinger, 1892, Mem. Lep. 6: 545. (Askold)

*Polyphaenis oberthuri*: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 672. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 270.

*Olivenebula oberthueri*: Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 756.

翅展 39 mm。头、胸及前翅霉绿杂黑色，前翅基线、内线及外线均双线黑色，基线、内线波浪形，外线锯齿形，中线、亚端线黑色，前者后半波浪形，剑纹细长，环纹及肾纹褐色黑边，端线为一列黑长点；后翅杏黄色，基部黑褐色，后缘一黑褐窄条，端区一黑褐宽带；腹部黑棕色，节间黄色。

**分布** 黑龙江、新疆、陕西、河南、湖北、福建、四川、云南；朝鲜，俄罗斯。

**绿影裙剑夜蛾 *Polyphaenis subviridis* (Butler) (图版XXXIV-4)**

*Plataplecta subviridis* Butler, 1878, Ill. Het. Br. Mus. 2: 32. (日本横滨)

*Trachea subviridis*: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 116. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 254.

*Polyphaenis subviridis*: Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 756.

翅展 38 mm。头、胸绿黄杂褐色；前翅微白带有绿黄色和暗褐色，尤其翅基部及亚中褶明显黄绿色，基线双线黑色，在中室后波浪形，线间白色，内线双线黑色，波浪形，环纹为一黑圈，剑纹黄绿色，黑边，肾纹黄绿色，内缘一黑直线，外缘微褐，外线自肾纹前方外伸至 8 脉，然后外弯并成锯齿形，双线黑色，线间白色，后半白色明显，亚端线白色，锯齿形，内侧衬褐色，端线为一列黑点；后翅褐黄色，有光泽；腹部浅灰褐色，毛簇端部褐黑色。

**分布** 江苏、浙江、湖北、湖南、江西、云南；日本。

**句夜蛾属 *Goenycta* Hampson**

*Goenycta* Hampson, 1909, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 8: 49.

Type-species: *Erastria niveiguttata* Hampson.

喙发达，下唇须向上伸，第二节达额之中部，第三节短，额有圆突，下有角质片；复眼大；胸部被毛；腹部背面有一列毛簇，第 3、4、5 节最大；前翅稍窄，有一副室；