

## 种 检 索 表

1. 环纹围以白点 ..... 2  
   环纹不围白点 ..... 3
2. 剑纹为一白点 ..... 聚星普夜蛾 *Prospalta siderea*  
   剑纹为一暗纹 ..... 卫星普夜蛾 *P. stellata*
3. 肾纹中央二白点 ..... 比星普夜蛾 *P. contigua*  
   肾纹中央一白点, 有褐曲纹 ..... 肾星普夜蛾 *P. leucospila*

聚星普夜蛾 *Prospalta siderea* Leech (图版XXXI-19)

*Prospalta siderea* Leech, 1900, Trans. ent. Soc. p. 121. (中国西部: Washan, 峨眉山, Ni-tou, Chia-kou-ho)

*Perigea siderea*: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 313. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 259.

翅展 28—34mm。头、胸及前翅棕褐色, 前翅基、内线由白点组成, 内线前端较显, 基线与内线间在中室后有一白点, 环纹中央为一斜长白点, 外围四个白点, 后端有一长白点, 肾纹中央为一白条, 内侧三个白点, 外侧四个白点, 后端一个白点, 中线只在前缘现一白色曲纹, 外线由一列白点组成, 内侧另有黑点, 亚端线由一列白点组成, 端线由暗色线及隐约的小白点组成, 缘毛棕褐色, 端部间白色, 基部有白点; 后翅褐色较暗, 中室有一暗褐斑, 缘毛灰白色, 腹部深褐色, 基节后缘有一白斑。

分布 浙江、湖南、四川。

卫星普夜蛾 *Prospalta stellata* Moore (图版XXXI-20)

*Prospalta stellata* Moore, 1882, Lep. Atk. p. 111. (大吉岭)

*Perigea stellata*: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 314. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 259.

翅展 34mm。头部黄褐色; 胸部黑褐色; 前翅棕褐色部分带黄色, 翅基部有 5 个白点, 其外方有三个白点, 自前缘脉外行至中室, 内线由各翅脉上的白点组成, 环纹中央为一白点, 内侧有二白点, 外侧有三个白点, 前方有一白点, 中线黑色, 肾纹中央为一白曲纹或分裂的曲纹, 周围有 11 个白点, 外线黑色, 锯齿形, 齿尖在翅脉上为白点, 在前缘脉处也成白点, 亚端线由各翅脉上的白点组成, 端线为一列白点; 后翅与腹部褐色。

分布 云南; 锡金。

比星普夜蛾 *Prospalta contigua* Leech (图版XXXI-21)

*Prospalta contigua* Leech, 1900, Trans. ent. Soc. p. 122. (中国西部)