

柄细长，为个体长的3-5倍；肌丝平滑没有明显的颗粒。

纤毛下的银线系统：表膜可见细的横纹，有砌砖状网状结构，前面的网状横纹结构比后面的反口纤毛环网结构更宽些，气孔稀少。反口纤毛环银线数：从围口部到反口纤毛环银线数19-22条，从反口纤毛环银线数到帚胚银线数13-16条。

生态特征 广盐性，在海洋与淡水中均有发现。观察到伸缩泡时有1个或有2个且大小不一，可能是生活环境或生理因素所致。在海水里的种类其柄比淡水中要长些。

地理分布 山东（青岛）、江西、福建（厦门）、广东；法国，德国。

(194) 斑点伪钟虫 *Pseudovorticella punctata* (Dons, 1918) (图版 LXVI: 194)

Vorticella punctata Dons, 1918: 1-18.

Vorticella subconica Stiller, 1946: 59, fig. 2.

Pseudovorticella subconica: Jankowski, 1976: 168-170.

Pseudovorticella punctata: Warren, 1987: 7, fig. 6.

体长：47.0-62.5 μm;

体宽：32.5-52.5 μm;

口围直径：43-60 μm;

口围盘直径：33.0-47.5 μm;

柄长：250-350 μm;

柄宽：4.8-6.0 μm。

形态特征 体呈钟形，但有变异，有些个体呈宽钟形。长度总是超过宽度，最长的长度为宽度的1.9倍。口围缘向外扩开，非常宽阔，其直径有时超过体长，口围盘小于口围，略凸出于口围边缘之外。伸缩泡1个，靠近口前庭。细胞核带形，纵位，两端弯转。外质表膜有许多泡状疙瘩排列成横纹，包括口围和口围盘都有。这些泡状疙瘩直径为1.7-2.0 μm，较整齐地横排列，尤其是在体边缘明显可见。食物泡椭圆形或近圆形，数量多。细胞质暗、多颗粒，伸缩泡1个位于前庭与胞咽之间，在伸缩时才能看清楚。前庭和胞咽可以延伸达到身体前1/3处。细胞核带状呈“J”字形。柄长为体长的4-5倍，柄内肌丝上有小颗粒。

生态特征 淡水、海洋均有分布。它可以附着于青萍、满江红、聚草、金鱼藻、枯枝碎屑上，甚至着生在枝角类及其他昆虫幼虫上。

地理分布 湖北、广东、海南（琼山）、广西、四川；俄罗斯，英国，挪威，匈牙利。

15. 独缩虫属 *Carchesium* Ehrenberg, 1831

Carchesium Ehrenberg, 1831: 93; Kahl, 1935: 736; Stiller, 1971: 153; Kudo, 1977: 1018; Corliss, 1979: 273; Aesch, 2001: 37.

Type species: *Carchesium polypinum* (Linnaeus, 1758).