

前缘脉内斜至中室后缘折向外再内斜，中线褐色，自前缘脉微曲内斜至中室后缘，外线褐色，自前缘脉外斜至8脉折角内斜，后半与内线平行，亚端线褐色，波浪形，有间断，在中褶处内凸，在亚中褶处外凸近达翅外缘，翅外缘有一列黑点，外缘近顶角处凹；后翅黄白色；腹部白色，背面带褐色。

分布 黑龙江、江苏、浙江、湖北、江西；日本。

裁夜蛾属 *Pterogonia* Swinhoe

Pterogonia Swinhoe, 1891, Trans. ent. Soc. Lond. p. 152.

Type-species: *Pterogonia episcopalis* Swinhoe.

Craspedogonia Hampson, 1893, Ill. Het. Colln Br. Mus. 9: 29, 117.

喙发达，下唇须向上伸，第三节长，额无突起，有尖毛簇，复眼大，触角线形；胸部主要被鳞片；前翅顶角尖而外突，外缘中部多外突成角，后半内斜，有一副室；后翅5脉发达。

种 检 索 表

前翅中室端部有一三角形银斑 裁夜蛾 *Pterogonia episcopalis*
前翅中室端部无三角形银斑 点肾裁夜蛾 *P. aurigutta*

裁夜蛾 *Pterogonia episcopalis* Swinhoe (图版 XL-4)

Pterogonia episcopalis Swinhoe, 1891, Trans. ent. Soc. Lond. p. 152, text fig. (印度)

Pterogonia episcopalis: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 363. —Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal Br. Mus. 11: 648. —Gaede, 1938, in Seitz, Macrolep. World 11: 451, pl. 43g. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 324.

翅展 41 mm 左右。头部及胸部淡紫灰色杂少许褐色，头顶及颈板有褐纹；前翅淡紫褐色，内半较灰，布有黑色细点及黑褐色细纹，前缘区基部锈褐色，基线及内线细弱，暗褐色，稍间断，内线前半曲折，中室端部有一银斑，呈三角形，围以红棕色边，前后各一银点，内侧有一黑棕斜线，后方有一黑棕斑，外线暗褐色，不完整，前段曲折，中段外弯，亚端线为一列黑点，前半粗，略呈锯齿形，内侧衬银色，缘毛端部黑棕色；后翅淡褐色，端区黑褐色；腹部浅褐色，端部黑褐色。

分布 海南；印度，新加坡等。

点肾裁夜蛾 *Pterogonia aurigutta* (Walker) (图版 XL-5)

Thalatta aurigutta Walker, 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 15: 1793. (新加坡)

Pterogonia [sic] *irrorata* Dudgeon, 1905, J. Bomb. N. H. Soc. 16: 402.

Pterogonia aurigutta: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 647. —Gaede, 1938, in Seitz, Macrolep. World 11: 451, pl. 43g. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 324.

翅展 36—44 mm。头部褐灰色杂有少许黑色，额与下唇须外侧黑色；胸部褐灰色杂有少许黑色；前翅黄色微带褐色，散布黑色细点，基线白色，自前缘脉外斜至中室后缘，内线白色，外侧衬褐色，呈直线极度外斜至 2 脉基部，折向后至 1 脉再外斜，在中脉处分出一支向外斜，肾纹仅在中室横脉两端各现一黑点，后端的点较粗，外线白色，外侧衬褐色，自前缘脉后内弯至 4 脉后折成一外突角，具后再内弯，亚端区在 5 脉后有一列黑点，缘毛端部暗褐色；后翅浅褐色，外半部黑褐色；雌蛾前翅肾纹金色，内线直线自前缘脉外斜至翅后缘；腹部淡黄灰色带褐色。

分布 广东、广西；锡金，不丹，新加坡。

黄夜蛾属 *Xanthodes* Guenée

Xanthodes Guenée, 1852, in Boisduval et Guenée, Hist. nat. Ins., Noct. 1: 209.

Type-species: *Phalaena malvae* Esper.

Acontia Hübner, [1823] 1816, Verz. bek. Schmett. p. 257.

喙发达，下唇须斜向上伸，前方具向下的长毛（雄虫），第二节达头顶，额平滑，上端有毛簇，复眼圆大，雄蛾触角有纤毛；胸部主要是鳞片，无毛簇，雄蛾胫节有长毛；腹部只基节有毛簇；前翅顶角钝，外缘曲度平稳，微呈锯齿形。

种 检 索 表

1. 前翅端区有一三角形斑 犁纹黄夜蛾 *Xanthodes transversa*
前翅端区无三角形斑 2
2. 前翅中室外一纵纹达翅外缘 焦条黄夜蛾 *X. graellsii*
前翅中室外无纵纹 黄夜蛾 *X. albago*

犁纹黄夜蛾 *Xanthodes transversa* Guenée (图版 XL-6)

Xanthodes transversa Guenée, 1852, in Boisduval et Guenée, Hist. nat. Ins., Noct. 1: 211, pl. 10, fig. 5. (爪哇)

Acontia transversa: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 654. Gaede, 1938, in Seitz, Macrolep. World 11: 452.

Xanthodes transversa: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 324.

翅展 34—48 mm。头、胸及前翅黄色，胸背有一赤褐纹；前翅各横线褐色，内线折角于中脉，外线折角于中褶，近达亚端线，亚端线折角于 7 脉，端区有一褐色大斑，约呈三角形，中部向内扩展至外线内侧；后翅黄色，缘毛褐色，2 脉后黄色；腹部褐黄