

Aventia Duponchel, 1829, Hist. nat. Lep. Papill. Fr. 7 (2): 190.

喙发达, 下唇须向上伸, 第二节饰密毛, 第三节小, 雄蛾触角线形, 有纤毛丛; 胸部背面无毛簇; 前翅顶角尖, 外缘前半强内凹, 中部外突成角; 后翅宽, 外缘弧曲; 幼虫第一、二对腹足较小。

勒夜蛾 *Laspeyria flexula* (Denis et Schiffermüller) (图版 LXIV-7)

Bombyx flexula [Denis et Schiffermüller], 1775, Schmett. Wien p. 64. (奥地利)

Phalaena sinulata Fabricius, 1777, Gen. Ins. Chil. p. 287.

Geometra flexularia Hübner, [1799], Saaml. Eur. Schmett., 5: pl. 4, fig. 19.

Laspeyria flexula: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World, 3: 398. —Forster, et al., 1971, Schmett. Mitteleur., p. 300. —Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 888. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 375. —Chen, 1993, Ins. Hengduan Mts. p. 1030.

翅展 29 mm。头部与颈板褐色, 胸部背面紫褐灰色; 前翅灰色, 密布褐黑色细点, 前缘脉赭色, 内线淡黄色, 两侧衬褐色, 自前缘脉外斜至中室前缘, 折角内斜, 近呈直线, 肾纹只现二黑点, 边缘白色, 合成“8”字形, 外线淡黄色, 两侧衬褐色, 自前缘脉外斜至 9 脉, 折角直线内斜, 亚端线黄白色, 不明显, 线外方色较暗, 近外缘前半部带金褐色并有几个黑点, 顶角尖锐外突, 翅外缘中部外突成一钝齿; 后翅淡黄色, 后半部密布褐色细点, 隐约可见暗褐色横脉纹, 外线淡黄色, 两侧衬褐色, 在中室前不明显, 亚端线不清晰; 腹部背面灰色带有黑色。

寄主 栎、松、云杉、梅衣属等、地衣。

分布 黑龙江、云南; 欧洲。

瑰夜蛾属 *Raparna* Moore

Raparna Moore, 1882, Lep. Atk. p. 177.

Type-species: *Raparna ochreipennis* Moore.

喙发达, 下唇须向上伸, 第二节达头顶, 第三节长, 稍向后伸成镰刀形; 额无突起, 雄蛾触角线形, 有鬃毛, 头部与胸部被鳞片; 前翅顶角稍钝, 副室有或无; 后翅 3、4 脉或共柄。

种 检 索 表

- 前翅有粉红纹 红纹瑰夜蛾 *Raparna roseata*
前翅带血红色 横线瑰夜蛾 *R. transversa*

红纹瑰夜蛾 *Raparna roseata* Wileman (图版 LXIV-8)

Raparna roseata Wileman, 1917, Entom. 50: 27. (日本)

Raparna roseata; Ogata, 1958, in Esaki, Icon. Het. Jap. p. 196. —Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 887. —Chen, 1985, Econ. Ins. Fr. China, Lep. Noct. 4: 145. pl. 14, fig. 284.

翅展 20 mm 左右。头部与胸部黄色杂暗粉红色，下唇须与足带淡褐色；前翅黄色，布有暗粉红不规则形斑纹，前缘区色暗，基线、内线不清晰，由暗粉红色纹组成，中室下角有一黑点，外线明显，暗粉红色，前半带褐色，较直，在中室外微外弯；后翅淡黄色，布有暗粉红色点纹，中部一暗粉红色线，粗而模糊，缘毛褐灰色。

分布 江西；日本。

横线瑰夜蛾 *Raparna transversa* Moore (图版 LXIV-9)

Raparna transversa Moore, 1882, Lep. Atk. p. 178. (印度)

Raparna transversa: Leech, 1900, Trans. ent. Soc. p. 611. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 401, pl. 71d. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 375.

翅展 21 mm。头部桃红色，下唇须基部灰色，第二节污褐色，第三节灰黑褐色，均杂有少许桃红色；胸部背面橙黄色杂红色，下胸灰白色，前足与中足胫节外侧带有红褐及黑褐色；前翅橙黄色杂血红色，前缘杂黑色，前缘基部后方黑色，内线黑色，仅中室前后可见，环纹只现一黑点，肾纹黄色，后半部有一黑点，外线黑色，粗，微曲内斜，亚端线与端线均为黑点列，不明显，缘毛褐灰色带紫色；后翅橙黄色杂血红色，前缘区黄白色带灰色，中室黄白色，横脉纹只现一黑点，外线黑色，较粗，近直线内斜，端线由一列黑点组成，缘毛褐灰色带紫色；腹部灰色杂黑色，基部几节背面黄色杂红色。

分布 湖北、云南；朝鲜，印度。

涓夜蛾属 *Rivula* Guenée

Rivula Guenée, [1845] 1844, in Duponchel, Cat. Meth. Lep. Eur. (2): 206.

Type-species: *Phalaena sericealis* Scopoli.

Cholimma Walker, [1863] 1864, J. Proc. Linn. Soc. Zool. 7: 60.

Motina Walker, 1863, List Spec. Lep. Br. Colln Br. Mus. 27: 12.

Rhazunda Walker, 1866, List. Spec. Lep. Br. Colln Br. Mus. 35: 1961.

Pasira Moore, 1882, Descr. new. Indian Lep. Ins. Colln late Atk. p. 197.

Rivulana Bethune-Baker, 1911, Ann. Mag. nat. Hist. 8, 8: 532.

喙发达，下唇须向前伸，第二节饰密鳞，第三节小，额无突起，上方有尖毛簇，雄蛾触角线形，有纤毛；胸部与腹部被鳞片；前翅 7、8、9 脉共柄，翅外缘平稳弧曲；后翅 3、4 脉共柄，5 脉发达。