

Type-species: *Noctua hybris* Hübner.

Rhaphia Agassiz [1847] 1846, Nom. zool. p. 321, 323.

Anodonta Rambur, 1858, Preoccupied, Cat. Lep. Andal. pl. 4, fig. 7.

Certila Walker, 1865, List Spec. Ins. Colln Br. Mus. 32: 448.

Saligena Walker, 1865, List Spec. Ins. Colln Br. Mus. 32: 605.

喙发达, 下唇须短, 紧贴前额, 额上有毛簇; 胸部被鳞片, 有扁毛簇; 腹部基部几节背面有毛簇, 足胫节长, 被密毛, 雄蛾触角栉形; 前翅宽, 顶角钝圆; 后翅5脉自中室横脉中后部发出, 6、7柄共柄。

种 检 索 表

前翅中区带有白色 波莽夜蛾 *Raphia peusteria*
前翅中区不带白色 鸦莽夜蛾 *R. corax*

波莽夜蛾 *Raphia peusteria* Püngeler (图版 II-3)

Raphia peusteria Püngeler, 1907, Dt. ent. Z. Iris, 19: 216, pl. 8, fig. 9. (青海湖区)

Raphia illarioni Filipjev, 1937, Lambillionea, 37: 66, figs. 3—4.

Raphia peusteria: Kozhantschikov, 1950, Fn. SSSR, 12: 425, figs. 214—5. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 363.

翅展 34—36mm。头、胸及前翅灰白杂黑色, 前翅内、外线黑色, 后者双线, 中室外半黄白, 亚端线灰色; 后翅白色, 亚中褶端部有黑斑, 其中有一白纹; 腹部褐黑杂灰色。雄蛾抱钩横向, 阳茎短粗。

分布 青海; 俄罗斯。

鸦莽夜蛾 *Raphia corax* Draudt (图版 II-4)

Raphia corax Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 159, pl. 9, fig. 21. (云南德钦)

Rhaphia [sic] *corax*: Chen et al., 1991, Noct. Fn. Xizang p. 342.

体长 14mm; 翅展 36mm。头部与胸部黑色杂少许白色; 前翅褐黑色, 隐约可见不规则波曲的黑色内线和外线, 中室端部色较浅, 隐约可见黑边的肾纹, 其内侧微白, 似一模糊斑块, 外线自前缘脉后外弯, 4脉后微波曲后垂, 线内方在2脉后至前缘脉近中部的区域色深, 亚端线不明显, 不规则波浪形, 灰白色, 内侧衬黑色, 端线黑色; 后翅白色, 1脉端部有几个黑纹, 缘毛间有灰黑色; 腹部黑褐色。

分布 云南、西藏。

剑纹夜蛾亚科 ACRONICTINAE

喙多发达, 下唇须较短, 额光滑或有突起, 或下方有角质片, 常有毛簇; 腹部背面