

前翅长：♀ 18 mm。额上半部、头顶、下唇须第一节大部和第二节腹面均黄白色。前翅黑褐色斑纹窄缩，白色区域扩展并略带乳黄色；外线外侧的白色带在 M_3 处伸达外缘；亚缘线较粗、较完整。后翅基部的黑灰色较少，翅面微带乳黄色，端带不完整。

雌性外生殖器（图 383）：无骨环。囊导管和囊体均短小，后者弱骨化。囊体底部有一小球状附囊。

检视标本：2♀，西藏察隅真空桥，3 820 m，1973. VIII. 21。

分布：青海、西藏。

德钦亚种 *subsp. consolabilis* (Prout, 1938) (图版 VII: 17)

Cidaria (Eulype) lugens consolabilis Prout, 1938, in Seitz, Macrolepid. World 4 (Suppl.): 158, pl. 15: h. (云南：德钦)

Eulype lugens consolabilis: Prout, 1941, ibidem 12: 335.

Rheumaptera lugens consolabilis: Xue, 1995, Sinozoologia 12: 224.

前翅长：♂ 16 mm。前翅深色斑纹宽度介于前述两个亚种之间，颜色较浅且较模糊。

检视标本：2♂，四川马尔康一道坪，3 200—3 700 m，1961. VII. 20。

分布：四川、云南。

黑带汝尺蛾 *Rheumaptera nigrifasciaria* (Leech, 1897)

Larentia nigrifasciaria Leech, 1897, Ann. Mag. nat. Hist. (6) 19: 662. (四川：Pu-tsu-fong)

Cidaria (Entephria) nigrifasciaria: Prout, 1914, in Seitz, Macrolepid. World 4: 237, pl. 7: i.

Entephria nigrifasciaria: Prout, 1939, ibidem 12: 274.

Rheumaptera nigrifasciaria: Aubert, 1959, Z. wien. ent. Ges. 44: 202.

体和翅灰褐色，斑纹深褐至黑褐色。前翅亚基线浅弧形带状；中域为一条鲜明的深色宽带，其内外缘为规则的锯齿状，中部色稍浅，具黑色短条状中点；翅端部深灰褐色，亚缘线白色波状，十分清晰；缘线黑褐色。后翅中点小，黑色；外线为一条完整的波状细线；缘线同前翅。后翅外缘波曲较浅。

未见标本。模式标本 1♂ 产于四川 Pu-tsu-fong，6 月，翅展 40 mm。

分布：四川。

暗汝尺蛾 *Rheumaptera fuscaria* (Leech, 1897)

Cidaria fuscaria Leech, 1897, Ann. Mag. nat. Hist. (6) 19: 655. (四川：打箭炉)

Cidaria (Entephria) fuscaria: Prout, 1914, in Seitz, Macrolepid. World 4: 235.

Entephria fuscaria: Prout, 1939, ibidem 12: 274.

Rheumaptera fuscaria: Aubert, 1959, Z. wien. ent. Ges. 44: 202.