

分布 甘肃。

异沁夜蛾 *Rhyacia mirabilis* Boursin (图版 X-30)

*Rhyacia mirabilis* Boursin, 1954, Bonn. zool. Beitr. 5: 260, pl. 4, figs. 20, 23, pl. 12, fig. 64. (四川巴塘)

*Chersotis mirabilis*: Chen *et al.*, 1991, Noct. Fn. Xizang p.88.

翅展 36mm。头部灰色杂有少许白色，下唇须黑色，端部黄褐色；胸部灰色杂有少许灰白色；前翅棕色杂有少许灰白色，后缘区基半部色较深，基线双线褐色，波浪形，自前缘脉至亚中褶，内线双线褐色，波浪形外斜，环纹小，黑色，外围色浅，肾纹黑色，近“V”形，外侧有一模糊褐点，外线呈褐黑色点列，亚端线模糊，端线褐色，缘毛灰白色，中有一灰白线，基部褐黄色；后翅灰褐色；腹部灰色杂有少许灰白色。

分布 四川、西藏；尼泊尔。

冬麦沁夜蛾 *Rhyacia auguridis* (Rothschild) (图版 X-31)

*Agrotis auguridis* Rothschild, 1914, Nov. zool. 21: 320. (阿尔及利亚)

*Rhyacia pseudosimulans* Kozhantschikov, 1929, Iris, 43: 183, fig. 3.

*Rhyacia auguroides*: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 288.




图 144 冬麦沁夜蛾 *Rhyacia auguridis* (Rothschild) ♂ 外生殖器

翅展 40mm。头、胸及前翅灰褐色杂少许黑色，前翅基线及内线均双线黑色，中、外线黑色，亚端线灰色，外线与亚端线锯齿形，环纹与肾纹灰黄色；后翅浅褐色；腹部褐色。雄蛾抱器瓣宽，抱钩短粗，抱器腹端有一皱褶，背侧一端部二叉形突，阳茎长(图 144)。