

翅展 38 mm。头部、胸部及前翅浅赭褐色，雄蛾触角微锯齿形，有纤毛丛；前翅顶角尖突，一微白线自顶角内斜至中室后，隐约可见一褐色亚端线，此外无其它斑纹；后翅褐色；腹部浅赭褐色。

分布 四川；日本，印度。

鸽口夜蛾 *Rhynchina columbaris* (Butler) (图版 LXV-41)

Orudizu columbaris Butler, 1889, Ill. Het. Colln Br. Mus. 7: 82, pl. 133, fig. 8. (印度)

Rhynchina columbaris: Leech, 1900, Trans. ent. Soc. p. 649. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep World 3: 429, pl. 72k. —Ogata, 1958, in Esaki, Icon. Het, Jap. p. 186. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 384. —Chen *et al.*, 1991, Noct. Fn. Xizang p.374.

翅展 30 mm。头部褐灰色，额浅黄色，头顶有尖毛簇，触角基节有黄白斑，下唇须暗褐色，基部灰白色，第二节外侧有一黑褐纵纹，第三节短；胸部背面褐灰色，前足与中足胫节外侧浅赭黄色，中部有一黑色纵纹；前翅褐灰色带紫色，散布黑色细点，一黑棕色内斜线自顶角至翅后缘中部，一棕色线自中脉中部至 1 脉基部，环纹只现一黑点，肾纹仅前后部各现一黑点，亚端线三线，棕色，内一线最长，外二线依次渐短，均内斜并微波曲，翅外缘有一列黑点，外线外方约呈褐灰色，顶角内半色较暗褐；后翅浅褐黄色带灰色；腹部棕灰色，基部背面黄褐色。

分布 河北、福建、西藏；日本，朝鲜，印度。

尖口夜蛾 *Rhynchina angustalis* (Warren) (图版 LXV-42)

Hypena angustalis Warren, 1888, Proc. zool. Soc. Lond. p. 317. (印度)

Rhynchina angustalis: Leech, 1900, Trans. ent. Soc. p. 649. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 430, pl. 73a. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 384.

翅展 33 mm。头部淡褐色，下唇须向前平伸，第二节上缘饰长鳞，下缘饰鳞较短，第三节细；胸部背面淡褐色，前足与中足胫节外侧黑褐色，跗节褐黑色，各节间有灰白斑，后足浅褐灰色杂有少许暗褐色；前翅狭长，顶角尖外突，褐灰色，布有黑色细点，环纹黑色，其后有一黑点位于 2 脉基部，中室外半部及中室外方色较红棕，外线由各翅脉间的黑点组成，一淡褐灰色纹自顶角内斜至中室前；后翅褐灰色，较宽肥，顶角稍外突；腹部暗褐色。

分布 云南、西藏；印度。

洁口夜蛾 *Rhynchina cramboides* (Butler) (图版 LXV-43)

Hormisa cramboides Butler, 1879, Ill. Het. Colln Br. Mus. 6: 62, pl. 56, fig. 6. (日本横滨)

Hormisa morosa Butler, 1879, Ann. Mag. nat. Hist. 5, 4: 446.