

Type-species: *Pyralis antiqualis* Hübner.

喙发达，下唇须向前伸，第三节向上伸；前翅较宽短，后翅近臀角处有鳞齿，被鳞浓密，微有竖鳞，内线在中部之前折角，均双线，亚端线锯齿形。

种 检 索 表

1. 前翅亚端线由锯齿形纹组成 丑齿口夜蛾 *Rhynchodontodes plusioides*
前翅亚端线不由锯齿形纹组成 2
2. 前翅顶角内斜线外方色暗 弓齿口夜蛾 *R. sagittata*
前翅顶角内斜线外方与翅同色 中齿口夜蛾 *R. mandarialis*

丑齿口夜蛾 *Rhynchodontodes plusioides* (Butler) (图版 LXV-37)

Hormisa plusioides Butler, 1879, Ill. Het. Colln Br. Mus. p. 61, pl. 56, fig. 5. (日本横滨)

Rhynchina plusioides; Leech, 1900, Trans. ent. Soc. p. 651.

Rhynchodontodes plusioides: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 431, pl. 73a. —

Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 173. —Ogata, 1958, in Esaki, Icon. Het. jap. p. 189. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 384. —Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 900, pl. 220, figs. 28—29.

翅展 23 mm。头部褐色，有白点，下唇须第一、二节及第三节基部前缘赭白色，其余褐色，第二节上缘饰致密长鳞，第三节斜向上伸，较细，端部尖；胸部灰褐色；前翅棕色带灰色，内线双线灰白色，自前缘脉外斜至亚中褶，折角内斜，外线双线白色，自前缘脉外斜至中褶，折角直线内斜，双线间棕色，亚端线由一系列深棕色齿形纹组成，除中部外，各纹内侧均衬以白色，亚中褶后有几个白纹，翅外缘有一列三角形黑点，亚中褶内半部有一灰白色纵条，端线白色，顶角有一白色斜纹，臀角后突成一锐齿；后翅褐色；腹部褐色。

分布 山西、江苏、浙江、江西、海南、四川；朝鲜，日本。

弓齿口夜蛾 *Rhynchodontodes sagittata* (Butler) (图版 LXV-38)

Rhynchina sagittata Butler, 1889, Ill. Het. Collb Br. Mus. 7: 93, pl. 133, figs. 10—11. (印度)

Rhynchina sagittata: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 432, pl. 73c.

翅展 22 mm。头部与胸部浅灰色带褐色；前翅浅紫灰色，顶角有一斜线，微曲内伸达翅后缘近中部，此线内侧灰白色，线外方色暗，线内方的中室至前缘脉带褐色，中室端部有一黑褐纹，外线双线外弯，亚端线浅灰色，前半不显，翅外缘有一列暗褐点；后翅浅褐灰色。

分布 湖北、四川；印度。