

曲纹涓夜蛾 *Rivula curvifera* (Walker) (图版 LXIV-12)

Hydrelia? *curvifera* Walker, 1862, Trans. ent. Soc. 3rd ser. i: 91. (斯里兰卡)

Erastria securifera Walker, [1863] 1864, J. Linn. Soc. 7: 58.

Hyela senna Swinhoe, 1891, Trans. ent. Soc. p. 148.

Hyela curvifera: Moore, 1884—1887, Lep. Ceyl. 3: 56.

Naranga curvifera: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 334.

Rivula curvifera: Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 894.

翅展 16 mm。头部浅灰褐色，触角基节有白斑，触角干基半部背缘带灰白色，下唇须第二节下缘饰暗褐长鳞；胸部背面巧克力色，下胸浅褐色；前翅浅灰褐色，一巧克力色曲条自翅基部后半外伸至外区弯向前达顶角，其前缘在外区亚中褶处凹，前缘及外缘均衬白色，中室端部有一模糊黑纵纹，外区前缘脉上有一列灰白点，巧克力色带的外前半有一列黑色纵纹，端区各翅脉间有模糊黑褐纵纹，翅外缘有一列弧形黑褐纹；后翅黑褐色；腹部黑褐色。

分布 四川；缅甸，印度，斯里兰卡，加里曼丹。

黄须涓夜蛾 *Rivula auripalpis* (Butler) (图版 LXIV-13)

Hydrelia auripalpis Butler, 1889, Ill. Het. Colln Br. Mus. 7: 64, pl. 129, fig. 8. (印度)

Rivula auripalpis: Ogata, 1958, in Esaki, Icon. Het. Jap. p. 182, pl. 116, fig. 2439. ——

Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 375. ——Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 896.

翅展 16 mm。头部棕色，下唇须内侧黄色，外侧黄褐色，第二节饰浓密鳞毛，似呈三角形，第三节极小；胸部棕色；前翅灰黄色带棕色，中线白色，内侧衬深棕色，自前缘脉微曲外斜，在中褶处不显，在中褶后近呈直线内斜，外线白色，内侧衬深棕色，自前缘脉强外斜，至 9 脉折角直线内斜，肾纹不明显，有不清晰的黑边，前后部中央各有一黑点，亚端线深棕色，波曲内斜，外侧有一列白点，翅外缘有一列黑棕点，缘毛黑褐色，基部有一浅黄线，端部褐黄色；后翅淡褐灰色；腹部暗褐色。

分布 海南、四川；印度，斯里兰卡，缅甸，日本，南太平洋岛屿。

凡夜蛾属 *Anachrostis* Hampson

Anachrostis Hampson, 1893, Ill. Het. Colln Br. Mus. 9: 98.

Type-species: *Anachrostis nigripuncta* Hampson.

喙发达，下唇须向上伸，第二节达头顶，额光滑无突起，复眼大，雄蛾触角线形；前翅 8、9、10 脉共柄，无副室；后翅 5 脉缺如，3、4 脉共柄。