

种 检 索 表

1. 前翅外缘中部外突 角涓夜蛾 *Rivula angulata*
 前翅外缘平稳弧曲 2
2. 前翅浅黄色 涓夜蛾 *R. sericealis*
 前翅非浅黄色 3
3. 前翅有一暗色纵条 曲纹涓夜蛾 *R. curvifera*
 前翅无暗色纵条 黄须涓夜蛾 *R. auripalpis*

角涓夜蛾 *Rivula angulata* Wileman (图版 LXIV-10)

Rivula angulata Wileman, 1911, Trans. ent. Soc. Lond. p. 267. (日本大和)

Rivula angulata: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 441, pl. 75k. —Ogata, 1958, in Esaki, Icon. Het. Jap. p. 182. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 375.

Wilemaniella angulata: Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 880.

翅展 19 mm。头部褐色，下唇须外侧黑棕色；胸部褐色，足跗节外侧黑棕色，各节间有白斑；前翅灰黄色带褐色，内线褐色，波浪形外弯，亚中褶后内斜，外线白色，自前缘脉外斜至 5 脉折角直线内斜，线内侧衬较宽的暗褐色，线外侧有一黄褐斑，位于 8 脉前方，约呈半圆形，亚端线黑色，有间断，中段外弯，亚中褶处稍内凹，顶角外凸，翅外缘中部外凸；后翅淡灰褐色，外缘中部外凸；腹部棕黑色，端部褐色。

分布 江苏；日本。

涓夜蛾 *Rivula sericealis* (Scopoli) (图版 LXIV-11)

Phalaena sericealis Scopoli, 1763, Ent. Carn. p. 242. (南斯拉夫)

Rivula sericealis: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 403, pl. 71i. —Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 169. —Forster, et al., 1971, Schmett. Mitteleur. p. 299. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 375. —Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 894.

翅展 15 mm。头部淡黄色，下唇须褐黄色，第二节饰鳞较宽，似呈三角形，第三节极小；胸部淡黄色；前翅淡黄色，肾纹短肥，暗褐色带灰色，中有二黑点，内线褐色，细弱不明显，外线褐色，自前缘脉强外斜至 9 脉折角内斜，在中褶处内凸，至 4 脉后直线内斜至翅后缘，端线褐色，外缘近顶角处有一黑点，缘毛色较暗；后翅白色，顶角区稍带褐色，翅外缘前半黑色；腹部黄白色。

寄主 短柄草。

分布 黑龙江、江苏、云南；欧洲，日本。