

insocia Walker.

Seudyra Stretch, 1875, Cist. ent. 2: 19.

喙发达；下唇须向上伸，第二节约达额中部，前面有毛，额突截锥形，有隆起的边，复眼圆大，雄蛾触角有纤毛；胸部有毛及毛形鳞，无毛簇；前足胫节有长毛，中足及后足也有少量毛；腹部背面有一列毛簇；前翅顶角钝，外缘不成锯齿形。

种与亚种检索表

1. 后翅一色黄 黄修虎蛾 *Sarbanissa flavida*
 后翅有暗带 2
2. 后翅有一亚端带 黑星修虎蛾 *S. insocia*
 后翅无亚端带，有端带 3
3. 后翅中室无黑点 4
 后翅中室有黑点 6
4. 后翅顶角有白纹 白斑修虎蛾 *S. albifascia*
 后翅顶角无白纹 5
5. 前翅灰色，前、后缘区色暗 羽修虎蛾 *S. longipennis*
 前翅一色黑 白云修虎蛾 *S. transiens*
6. 前翅亚中褶有黑纵纹 7
 前翅亚中褶无黑纵纹 8
7. 后翅端带在 2 脉后间断 小修虎蛾 *S. mandarina*
 后翅端带连贯 高山修虎蛾 *S. bala*
8. 后翅臀角有橙色斑 葡萄修虎蛾 *S. subflava*
 后翅臀角无橙色斑 9
9. 后翅端带有间断 10
 后翅端带连贯 背点修虎蛾 *S. catocaloides*
10. 后翅带褐色 艳修虎蛾云南亚种 *S. venusta yunnana*
 后翅不带褐色 艳修虎蛾指名亚种 *S. venusta venusta*

黄修虎蛾 *Sarbanissa flavida* (Leech) (图版 VI-7)

Seudyra flavida Leech, 1890, Entom. 23: 110. (湖北长阳)

Zalissa flavida: Leech, 1899, Trans. ent. Soc. p. 212. — Jordan, 1909, in Seitz, Macrolep.

World 3: 7, pl. 1e.

Seudyra flavida: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 9: 432, pl. 146, fig. 9. —

Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 388.

翅展 60mm。头部与胸部黑棕色，颈板基半部红棕色，下胸与足杏黄色；前翅灰色，密布棕色细点，中脉、2 脉后大部暗紫色，内线与外线均双线黑色，后者波曲外

弯，环纹与肾纹紫色，有灰白边，外线前后端外侧各有一枣红色斑，顶角有一枣红色斑，翅外缘有一列暗棕纹；后翅杏黄色；腹部杏黄色，背面有一列黑斑。

分布 湖北、湖南、四川、云南、西藏。

黑星修虎蛾 *Sarbanissa insocia* Walker (图版 VI-8)

Sarbanissa insocia Walker, 1865, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 33: 746. (大吉岭)

Phaegorista catocalina Walker, 1866, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 35: 1859.

Zalissa exigui fascia Swinhoe, 1892, Cat. east & Aust. Lep. Het. p. 167.

Seudyra catocalina: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 9: 433. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 390.

翅展 54mm。头部黑棕色杂黄色及灰色，下唇须基部黄色，颈板基部有一黄纹，端部灰色；胸部黑棕色，下胸及中、后足杏黄色；前翅前半在外线内方灰黄色，密布黑棕细点，其余部分暗棕色，顶角及亚中褶带有枣红色，环纹与肾纹黑棕色，较大，白边，内线黄色，外弯，外线双线黄色，在 4 脉折成一锐角，顶角区带有铅灰色并布细白点；后翅杏黄色，中室端有一小黑圆斑，亚端区有一黑带，在 4 脉处窄缩，前端只达 6 脉；腹部黄色，背毛簇黑色。

分布 云南、西藏；锡金，印度。

白斑修虎蛾 *Sarbanissa albifascia* (Walker) (图版 VI-9)

Catocala albifascia Walker, 1865, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 33: 933. (印度)

Zalissa albifascia: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 157. —Leech, 1899, Trans. ent. Soc. p. 214. —Jordan, 1909, in Seitz, Macrolep. World 3: 8, pl. 1f.

Seudyra albifascia: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 9: 439. —Jordan, 1912, in Seitz, Macrolep. World 11: 26. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 390.

翅展 45mm。头、胸及前翅深棕色杂少许灰白，前翅基部一黄白斜纹，其后的黑纵纹，内、外线均双线黑棕色，环、肾纹黑边，肾纹外方一曲缘大白斑，外线外侧另一白纹，亚端线黑棕色；后翅黄色，端带黑色，顶角及其外缘毛白色；腹部黄色，臀节有棕色斑。

分布 华北、广东；印度。

羽修虎蛾 *Sarbanissa longipennis* (Walker) (图版 VI-10)

Catocala? longipennis Walker, 1865, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 33: 934. (Bengal)

Seudyra longipennis: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 9: 432, text fig. 207. —

Jordan, 1912, in Seitz, Macrolep. World 11: 27, pl. 4d. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin.

3: 389. —Chen, 1993, Ins. Hengduan Mts. p. 1033.