

弯，环纹与肾纹紫色，有灰白边，外线前后端外侧各有一枣红色斑，顶角有一枣红色斑，翅外缘有一列暗棕纹；后翅杏黄色；腹部杏黄色，背面有一列黑斑。

**分布** 湖北、湖南、四川、云南、西藏。

### 黑星修虎蛾 *Sarbanissa insocia* Walker (图版 VI-8)

*Sarbanissa insocia* Walker, 1865, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 33: 746. (大吉岭)

*Phaegorista catocalina* Walker, 1866, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 35: 1859.

*Zalissa exigui fascia* Swinhoe, 1892, Cat. east & Aust. Lep. Het. p. 167.

*Seudyra catocalina*: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 9: 433. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 390.

翅展 54mm。头部黑棕色杂黄色及灰色，下唇须基部黄色，颈板基部有一黄纹，端部灰色；胸部黑棕色，下胸及中、后足杏黄色；前翅前半在外线内方灰黄色，密布黑棕细点，其余部分暗棕色，顶角及亚中褶带有枣红色，环纹与肾纹黑棕色，较大，白边，内线黄色，外弯，外线双线黄色，在 4 脉折成一锐角，顶角区带有铅灰色并布细白点；后翅杏黄色，中室端有一小黑圆斑，亚端区有一黑带，在 4 脉处窄缩，前端只达 6 脉；腹部黄色，背毛簇黑色。

**分布** 云南、西藏；锡金，印度。

### 白斑修虎蛾 *Sarbanissa albifascia* (Walker) (图版 VI-9)

*Catocala albifascia* Walker, 1865, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 33: 933. (印度)

*Zalissa albifascia*: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 157. —Leech, 1899, Trans. ent. Soc. p. 214. —Jordan, 1909, in Seitz, Macrolep. World 3: 8, pl. 1f.

*Seudyra albifascia*: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 9: 439. —Jordan, 1912, in Seitz, Macrolep. World 11: 26. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 390.

翅展 45mm。头、胸及前翅深棕色杂少许灰白，前翅基部一黄白斜纹，其最后一黑纵纹，内、外线均双线黑棕色，环、肾纹黑边，肾纹外方一曲缘大白斑，外线外侧另一白纹，亚端线黑棕色；后翅黄色，端带黑色，顶角及其外缘毛白色；腹部黄色，臀节有棕色斑。

**分布** 华北、广东；印度。

### 羽修虎蛾 *Sarbanissa longipennis* (Walker) (图版 VI-10)

*Catocala? longipennis* Walker, 1865, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 33: 934. (Bengal)

*Seudyra longipennis*: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 9: 432, text fig. 207. —

Jordan, 1912, in Seitz, Macrolep. World 11: 27, pl. 4d. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin.

3: 389. —Chen, 1993, Ins. Hengduan Mts. p. 1033.

翅展 57mm。头部与胸部棕黑色，颈板近基部锈褐色，端部灰色，下胸与足杏黄色；前翅灰色，密布黑棕细点，中脉及 2 脉后方暗紫色，内线后半明显，双线黑色，线间暗红色，环纹与肾纹紫棕色，肾纹大，外缘凹，外线双线黑棕色，线间及外侧灰黄色，中部外突，前段外侧带紫棕色，其上有一紫灰纹；后翅杏黄色，端区有一棕黑带；腹部杏黄色，背面有一列黑毛簇。

**分布** 云南；印度，孟加拉国。

### 白云修虎蛾 *Sarbanissa transiens* (Walker) (图版 VI-11)

*Eusemia transiens* Walker, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 7: 1588. (爪哇)

*Agarista aegoceroides* Felder, 1874, Reis. Nov. pl. 107, fig. 10.

*Seudyra dissimilis* Swinhoe, 1890, Trans. ent. Soc. p. 174.

*Seudyra subalba* Leech, 1890, Entom. 23: 110.

*Seudyra transiens subalba*: Mell, 1936, Stett. ent. Z. p. 180, figs. 12—13.

*Seudyra transiens*: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 9: 437. —Jordan, 1912, in Seitz, Macrolep. World 11: 27, pl. 4d. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 389.

翅展 47mm。头、胸及前翅棕色，前翅内线后半内侧带枣红色，近臀角处一枣红斑，环纹与肾纹棕黑色，肾纹外一白斑，亚端线灰色；后翅杏黄色，端带棕黑色；腹部杏黄色，背面一列黑毛簇。

**寄主** 葡萄属。

**分布** 湖南、云南；印度，缅甸，马来西亚，印度尼西亚。

### 小修虎蛾 *Sarbanissa mandarina* (Leech) (图版 VI-12)

*Seudyra mandarina* Leech, 1890, Entom. 23: 110. (湖北长阳)

*Zalissa mandarina*: Leech, 1899, Trans. ent. Soc. p. 213. —Jordan, 1909, in Seitz, Macrolep. World 3: 7, pl. 1e.

*Seudyra mandarina*: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 9: 434, pl. 146, fig. 10. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 390. —Chen, 1992, in Peng, Icon. For. Ins. Hunan, p. 1043. —Chen, 1993, Ins. Hengduan Mts. p. 1033.

翅展 40mm。头部与胸部暗褐色杂灰黄色；前翅暗褐色杂灰色，后缘区及顶角带枣红色及蓝紫色，翅脉灰色，内线在中室后明显，环纹与肾纹大，紫蓝色，灰边，外线双线灰色，中部外突，亚端线灰色，锯齿形，端线灰色；后翅杏黄色，横脉纹黑色，椭圆形，顶角有一黑斑，其内缘曲折，臀角有一黑色椭圆形大斑，亚中褶基部有一黑纵纹；腹部杏黄色，各节背面中央有黑斑。

**分布** 湖北、四川、云南。