

翅展 57mm。头部与胸部棕黑色，颈板近基部锈褐色，端部灰色，下胸与足杏黄色；前翅灰色，密布黑棕细点，中脉及 2 脉后方暗紫色，内线后半明显，双线黑色，线间暗红色，环纹与肾纹紫棕色，肾纹大，外缘凹，外线双线黑棕色，线间及外侧灰黄色，中部外突，前段外侧带紫棕色，其上有一紫灰纹；后翅杏黄色，端区有一棕黑带；腹部杏黄色，背面有一列黑毛簇。

分布 云南；印度，孟加拉国。

白云修虎蛾 *Sarbanissa transiens* (Walker) (图版 VI-11)

Eusemia transiens Walker, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 7: 1588. (爪哇)

Agarista aegoceroides Felder, 1874, Reis. Nov. pl. 107, fig. 10.

Seudyra dissimilis Swinhoe, 1890, Trans. ent. Soc. p. 174.

Seudyra subalba Leech, 1890, Entom. 23: 110.

Seudyra transiens subalba: Mell, 1936, Stett. ent. Z. p. 180, figs. 12—13.

Seudyra transiens: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 9: 437.——Jordan, 1912, in Seitz, Macrolep. World 11: 27, pl. 4d.——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 389.

翅展 47mm。头、胸及前翅棕色，前翅内线后半内侧带枣红色，近臀角处一枣红斑，环纹与肾纹棕黑色，肾纹外一白斑，亚端线灰色；后翅杏黄色，端带棕黑色；腹部杏黄色，背面一列黑毛簇。

寄主 葡萄属。

分布 湖南、云南；印度，缅甸，马来西亚，印度尼西亚。

小修虎蛾 *Sarbanissa mandarina* (Leech) (图版 VI-12)

Seudyra mandarina Leech, 1890, Entom. 23: 110. (湖北长阳)

Zalissa mandarina: Leech, 1899, Trans. ent. Soc. p. 213.——Jordan, 1909, in Seitz, Macrolep. World 3: 7, pl. 1e.

Seudyra mandarina: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 9: 434, pl. 146, fig. 10.——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 390.——Chen, 1992, in Peng, Icon. For. Ins. Hunan, p. 1043.——Chen, 1993, Ins. Hengduan Mts. p. 1033.

翅展 40mm。头部与胸部暗褐色杂灰黄色；前翅暗褐色杂灰色，后缘区及顶角带枣红色及蓝紫色，翅脉灰色，内线在中室后明显，环纹与肾纹大，紫蓝色，灰边，外线双线灰色，中部外突，亚端线灰色，锯齿形，端线灰色；后翅杏黄色，横脉纹黑色，椭圆形，顶角有一黑斑，其内缘曲折，臀角有一黑色椭圆形大斑，亚中褶基部有一黑纵纹；腹部杏黄色，各节背面中央有黑斑。

分布 湖北、四川、云南。