

为披针形黑环，环纹、肾纹黑色围以浅褐及黑边，两纹间黑色，亚端线浅褐黄色，后半波浪形，前端内侧一黑斑；后翅烟褐色；腹部黑棕色。雄蛾抱器瓣窄长，有一列细冠刺（图 458）。




图 458 幻夜蛾 *Sasunaga tenebrosa* (Moore) ♂ 外生殖器

**分布** 湖南、福建、广东、海南、广西、云南；印度，斯里兰卡，新加坡，大洋洲。

#### 长斑幻夜蛾 *Sasunaga longiplaga* Warren (图版 XXVIII-4)

*Sasunaga longiplaga* Warren, 1912, Nov. zool. 19: 15. (马来西亚)

*Magusa longiplaga*: Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 24.

翅展 39mm。头部浅赭黄色；胸部褐黄色；前翅浅灰赭色，翅脉微黑，亚端线浅赭黄色，其余各横线黑色，内线、外线均双线，亚中褶基部一黑纵线，其前一浅黄斑及一黑褐纵纹，一黑色大长斑自内线中段至翅外缘，环纹、肾纹可见黑边，外区前缘有一近三角形黑褐斑；后翅烟褐色；腹部黄褐色。雄蛾抱器瓣窄长，抱钩短，端部双齿形（图 459）。

**分布** 海南、西藏；锡金，马来西亚，大洋洲。

#### 霉幻夜蛾 *Sasunaga leucorina* (Hampson) (图版 XXVIII-7)

*Magusa leucorina* Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 57, pl. 108, fig. 9. (巴布亚新几内亚)

*Magusa olivaria* Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. p. 55.

*Magusa olivaria*: Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 24.

*Sasunaga leucorina*: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 120. —Holloway, 1989, Malay, Nat. J. 42: 146.

翅展 39mm。头、胸赭白杂棕色；前翅浅黄带霉绿色，中线内方的前半带黑色，端区大部带黑色，翅基部一白条沿 1 脉伸至内线，其中部前方一黑纹，后方一黑条，衬以绿色，亚端线白色，其余横线黑色，基线、内线及外线均双线，内线波浪形，外线锯齿形，环纹、肾纹霉绿色，亚端线前段内方一黑棕斑；后翅与腹部暗褐色。雄蛾抱器瓣窄（图 460）。

分布 海南；巴布亚新几内亚。




图 459 长斑幻夜蛾 *Sasunaga longiplaga*  
Warren ♂ 外生殖器




图 460 霉幻夜蛾 *Sasunaga leucorina*  
(Hampson) ♂ 外生殖器

### 尖纹幻夜蛾 *Sasunaga apiciplaga* Warren (图版 XXVIII-10)

*Sasunaga apiciplaga* Warren, 1912, Nov. zool. 19: 15. (印度尼西亚)

*Sasunaga apiciplaga*: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 121.

*Magusa apiciplaga*: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 252.

翅展 46mm。头与颈板黑棕色；胸部褐黄色；前翅前半大部黑棕色，后半大部褐黄色，中室大部黑色，翅基部一黄纹，沿 1 脉外伸至黄色区，基线、内线均双线黑色，后半均不显，环纹褐黄色，肾纹黄色，外侧一黑纹，外线黑色波浪形，前端外侧一梯形黑斑，亚端线褐黄色；后翅暗棕色，后缘毛金黄色；腹部黑棕色。

分布 海南；印度尼西亚。

### 间纹幻夜蛾 *Sasunaga interrupta* Warren (图版 XXVIII-11)

*Sasunaga interrupta* Warren, 1912, Nov. zool. 19: 15. (巴布亚新几内亚)