

图 253—254 雄性外生殖器. 253. 间三叶尺蛾 *Sauris interruptaria* (Moore);
254. 蛭三叶尺蛾 *S. hirudinata* Guenée

雌性外生殖器 (图 255): 囊导管短粗, 囊体肥大, 由囊导管中部至囊体近底部处内面均散布微刺。

检视标本: 2♀, 海南尖峰岭, 1982. IV. 6、27; 1♂1♀, 同前, 1983. V. 4。

分布: 台湾、海南; 日本, 越南, 菲律宾, 印度, 锡金, 斯里兰卡, 马来西亚, 印度尼西亚, 巴布亚新几内亚。

蛭三叶尺蛾 *Sauris hirudinata* (Guenée, 1857) (图版 V: 1)

Sauris hirudinata Guenée, 1857, in Boisduval & Guenée, Hist. nat. Insectes (Spec. gen Lepid.) 10: 364.

Remodes abortivata Guenée, ibidem 10: 364.

Sauris remodesaria Walker, 1862, List Specimens lepid. Insects Colln Br. Mus. 24: 1253.

Remodes lobata Warren, 1895, Novit. zool. 2: 107.

前翅长: ♂ ♀ 13 mm。头和胸部背面、前翅橄榄绿色。下唇须较前种略短, 约 2/3—3/4 伸出额外。触角黑灰色。♂ 中足胫节无毛束, 后足胫节毛束弱小, 浅灰褐色。♂ 第二腹节侧面毛束焦褐色。♂ 前翅中等宽度, 后缘与前缘长度之比约 0.62:1。前翅密布波状线纹; 亚基线灰褐色, 其它线纹深灰褐与绿色相间; 中线与外线间距离较其它线纹间距略宽, 中点黑灰色, 肾形; 缘线黑色, 纤细, 在翅脉端扩展成黑点; 缘毛基半部灰褐与灰黄色相间, 端半部灰白色。后翅灰褐色, ♀ 可见深色条形中点; ♂ 后翅端部分裂为三片, 中片黑褐色, 后缘附近深灰褐色。翅反面灰褐色。

雄性外生殖器 (图 254): 囊形突短。抱器瓣较前种宽阔, 抱器背端突平伏在抱器瓣上, 短钝角状。




图 255—258 雌性外生殖器。255. 间三叶尺蛾 *Sauris interruptaria* (Moore); 256. 蛭三叶尺蛾 *S. hirudinata* Guenée; 257. 荫三叶尺蛾 *S. inscissa* Prout; 258. 狭带三叶尺蛾 *S. angustifasciata* (Inoue)

雌性外生殖器 (图 256): 囊导管极细长。囊体小, 卵圆形, 内面密生微刺。

寄主植物: 荔枝及蔷薇科植物。

检视标本: 1 ♂, 福建漳州, 1978. VII. 6; 2 ♂ 2 ♀, 广东广州, 1987. XI. 13—25。

分布: 福建、台湾、广东、香港; 印度, 斯里兰卡, 马来西亚, 印度尼西亚。

荫三叶尺蛾 *Sauris inscissa* Prout, 1958 (图版 V: 2)

Sauris inscissa Prout, 1958, Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.) 6: 460, figs 68, 69. (印度: 卡西丘陵)

前翅长: ♀ 17 mm。近似间三叶尺蛾。下唇须略短, 触角黑褐色, 体和翅色黄绿色。♂ 前翅外缘在臀角上方无裂口, 与该种明显区别。前翅线纹较少, 黑褐色; 亚基线粗壮, 下端常向外扩展; 中线和外线间形成黑褐色中带, 其间仅局部显露底色, 中点黑色细条形; 浅色亚缘线两侧散布黑褐色斑块。

雌性外生殖器 (图 257): 囊导管特别细长。囊体较缘点三叶尺蛾大, 不规则圆形, 内面散布微刺。

检视标本: 1 ♀, 海南尖峰岭, 1983. IV. 14。

分布: 台湾、海南; 印度, 缅甸。