



图 255—258 雌性外生殖器. 255. 间三叶尺蛾 *Sauris interruptaria* (Moore); 256. 蛭三叶尺蛾 *S. hirudinata* Guenée; 257. 荫三叶尺蛾 *S. inscissa* Prout; 258. 狭带三叶尺蛾 *S. angustifasciata* (Inoue)

雌性外生殖器 (图 256): 囊导管极细长。囊体小, 卵圆形, 内面密生微刺。

寄主植物: 荔枝及蔷薇科植物。

检视标本: 1 ♂, 福建漳州, 1978. VII. 6; 2 ♂ 2 ♀, 广东广州, 1987. XI. 13—25。

分布: 福建、台湾、广东、香港; 印度, 斯里兰卡, 马来西亚, 印度尼西亚。

荫三叶尺蛾 *Sauris inscissa* Prout, 1958 (图版 V: 2)

Sauris inscissa Prout, 1958, Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.) 6: 460, figs 68, 69. (印度: 卡西丘陵)

前翅长: ♀ 17 mm。近似间三叶尺蛾。下唇须略短, 触角黑褐色, 体和翅色黄绿色。♂ 前翅外缘在臀角上方无裂口, 与该种明显区别。前翅线纹较少, 黑褐色; 亚基线粗壮, 下端常向外扩展; 中线和外线间形成黑褐色中带, 其间仅局部显露底色, 中点黑色细条形; 浅色亚缘线两侧散布黑褐色斑块。

雌性外生殖器 (图 257): 囊导管特别细长。囊体较缘点三叶尺蛾大, 不规则圆形, 内面散布微刺。

检视标本: 1 ♀, 海南尖峰岭, 1983. IV. 14。

分布: 台湾、海南; 印度, 缅甸。